

## KULLANMA TALİMATI

### MEBUCAIN 2 mg/1 mg naneli pastil

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir pastil 2 mg setilpiridinyum klorür ve 1 mg lidokain hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Nane yağı, levomentol, asesulfam potasyum, mısır nişastası, sitrik asit monohidrat, makrogol, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, sorbitol (E420), saf su

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MEBUCAIN'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **MEBUCAIN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MEBUCAIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MEBUCAIN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MEBUCAIN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. MEBUCAIN nedir ve ne için kullanılır?

- MEBUCAIN etkin madde olarak setilpiridinyum ve lidokain HCl içeren, pastil formunda bir üründür.
- MEBUCAIN boğaz preparatları olarak adlandırılan ilaç grubunun antiseptikler ve anestezipler sınıfına dahil bir üründür.
- MEBUCAIN 20 adet pastil içeren blister ambalajlarda, orijinal karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
- MEBUCAIN,
  - Lokal antiseptik (bölgesel etkili mikrop öldürücü) ve ağrı kesici etkisiyle, boğaz ağrısında, ağız ve boğazın minör enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak, kuru öksürük, soğuk algınlığı ve gribe eşlik eden ağrı ve tahrişin giderilmesinde kullanılır.

## 2. MEBUCAIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### MEBUCAIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Etkin maddelere veya diğer lokal anesteziplere veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise

### MEBUCAIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- MEBUCAIN kullanımınızla 5 gün sonra şikayetleriniz devam eder veya belirtilere yüksek ateş, baş dönmesi veya kusma eşlik ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- MEBUCAIN'i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.
- MEBUCAIN, 6 yaşın altındaki çocuklar için tavsiye edilmez.
- MEBUCAIN anyonik ajanlar örneğin diş macunları ile birlikte kullanmaya uygun değildir. bu nedenle MEBUCAIN'i dişlerinizi fırçalamanın hemen öncesinde ya da sonrasında kullanmayınız
- Boğazınızda ya da ağızınızda aktif olarak kanayan kesik ya da yaralar varsa MEBUCAIN kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

### **MEBUCAIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

MEBUCAIN'i yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen önce kullanmayınız. MEBUCAIN, ağız ve boğazda geçici uyuşukluğa neden olabilir ve yutmayı etkileyebilir. Uyuşukluk geçinceye kadar yeme/içmeden kaçınılmalıdır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- MEBUCAIN'i gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- MEBUCAIN'i emzirme döneminde kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

MEBUCAIN'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

### **MEBUCAIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

MEBUCAIN sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Diğer antiseptik ürünlerle birlikte kullanmayınız.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. MEBUCAIN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Bir seferde 1 pastilden fazla kullanmayınız.

Önerilen dozu ve kullanım süresini aşmayınız.

MEBUCAIN'i şikayetlerinizin tedavisi için en düşük miktar ve en kısa tedavi süresinde kullanmanız gerekmektedir.

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklar:

Şiddetli rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca göre 1-2 saatte 1 pastil

Hafif rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca göre 2-3 saatte 1 pastil

Günlük 6 pastili aşmamalıdır.

6-11 yaşındaki çocuklar

İhtiyaca göre 3-4 saatte bir 1 pastil

Günlük doz 3 pastili aşmamalıdır.

MEBUCAIN'i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

MEBUCAIN'i ağız yoluyla alınız.

MEBUCAIN pastili ağzınızda yavaşça eritiniz. Pastil, tamamen eriyene kadar düzenli olarak ağzın bir yerinden diğer yerine taşınmalıdır. Çiğnemeyiniz ya da yutmayınız.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:**

MEBUCAIN'in 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

**Yaşlılarda kullanım:**

MEBUCAIN'in yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek /Karaciğer yetmezliği:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer MEBUCAIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla MEBUCAIN kullandıysanız:**

MEBUCAIN'in fazla miktarda kazara yutulması bulantı ve kusmaya neden olabilir. Derhal süt veya suda çırpılmış yumurta beyazının verilmesi önerilmektedir.

*MEBUCAIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **MEBUCAIN’i kullanmayı unutursanız**

Eğer MEBUCAIN’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacınızı alınız ve ardından gerektiği takdirde dört saat içinde tedaviye devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

### **MEBUCAIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

MEBUCAIN ardarda en fazla 5 gün kullanım içindir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

**Aşağıdakilerden biri olursa MEBUCAIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

Cilt kızarıklıkları ya da döküntü (kaşıntılı kabarcıklı kızarıklık) gibi alerjik reaksiyonlar.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MEBUCAIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Tüm ilaçlar gibi, MEBUCAIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkileri aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz**

**Seyrek :** Bulantı, ağız ve boğazda tahriş

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800

314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. MEBUCAIN'in saklanması**

*MEBUCAIN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MEBUCAIN'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MEBUCAIN'i kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi** : GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş  
Levent, Şişli-İSTANBUL

**Üretim Yeri** : Novartis Ürünleri  
Kurtköy-İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*