

## KULLANMA TALİMATI

### TOBREX %0.3 steril oftalmik merhem

Göze sürülerek uygulanır.

#### Steril

- **Etkin madde:** 1 g'da 3 mg tobramisın
- **Yardımcı maddeler:** Klorbutanol anhidrit, mineral yağ, beyaz petrolatum

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **TOBREX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **TOBREX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **TOBREX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **TOBREX'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. TOBREX nedir ve ne için kullanılır?**

TOBREX, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TOBREX anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu göz(ler)e hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisın) içerir.

TOBREX 3.5 g tüpte plastik uç ve kapak ile sunulan beyaz-kırık beyaz homojen steril bir merhemdir.

#### **2. TOBREX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**TOBREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer

- Tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise
- Aminoglikozitlere alerjiniz varsa.

## **TOBREX'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer,

- Tobrex kullanımı ile alerjik reaksiyonlar geiriyorsanız, ila kullanımına son veriniz ve doktorunuza bařvrunuz. Alerjik reaksiyonlar lokal kařıntı ya da deri kızarıklığından řiddetli alerjik reaksiyonlara (anaflaktik reaksiyonlar) ya da ciddi deri reaksiyonlarına kadar deđiřkenlik gsterebilir. Bu alerjik reaksiyonlar aynı ila grubundan olan (aminoglikozidler) diđer topikal (yzeysel) ve sistemik etkili antibiyotiklerle de grlebilir.
- Bazı hastalarda yzeysel (topikal) olarak uygulanan aminoglikozidlere (antibiyotikler) karřı ařırı duyarlılık oluřabilmektedir. Diđer aminoglikozid sınıfı antibiyotiklere de apraz-duyarlılık ayrıca oluřabilmektedir. Eđer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri oluřursa, tedaviyi durdurunuz.
- Tobrex ile birlikte bařka antibiyotik tedavileri de kullanıyorsanız, doktorunuza sorunuz.
- Sistemik aminoglikozid antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıldıđında rnn kulak, bbrek ve sinirlerde birikimine bađlı olarak oluřabilecek kulakta ınlama, iřitme kaybı, bař dnmesi, denge bozukluđu, idrar ıkıřında azalma, idrarda kan ve vcutta řiřlik gibi belirtilerin grleceđi zehirlenme etkileri gz nnde bulundurulmalıdır.
- Myasthenia gravis ya da Parkinson hastalığı gibi hastalıklarınız varsa ya da daha nce byle bir hastalık yařadıysanız, doktorunuzun tavsiyesini alın. Bu tip hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotikler kas zayıflığını řiddetlendirebilir.
- Tm antibiyotik ilalarda olduđu gibi, uzun sre kullanımı duyarlı olmayan bakterilerin ve mantarların (ilaca diren geliřtiren organizmalar) artmasına neden olabilir, eđer byle bir sperinfeksiyon (herhangi bir infeksiyon ile zayıf dřen bnyede ikinci bir infeksiyonun bařlaması) geliřirse, uygun tedavi bařlatılmalıdır.
- Bir gz infeksiyonunun tedavisi sresince kontakt lens kullanımı nerilmemektedir. Bu rnle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.
- Bu ilacı doktorunuzun nerdiđi sre boyunca kullanınız.
- Hastalığınız ktleřirse veya hastalık belirtileri tekrar ortaya ıkarsa doktorunuza danıřınız.
- Gz merhemleri korneadaki yaraların iyileřmesini geciktirebilir.
- Gz infeksiyonlarının tedavisi sırasında, kontakt lens takılması nerilmez, zira tedavi esnasında kullanımı mevcut durumunuzu daha da ktleřtirebilir. Bu rnle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.
- Bařka ilalar kullanıyorsanız, ltfen 'Diđer ilalar ile birlikte kullanımı' blmn okuyunuz

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **TOBREX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

rn nerildiđi řekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve ieceklerle etkileřme gstermesi beklenmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Doktorunuzun tedavinize karar vermesi gerekmektedir ve kesinlikle gerekli olmadıka kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme süresince TOBREX kullanıp kullanamayacağınıza veya emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına doktorunuz karar verecektir.

## **Araç ve makine kullanımı**

TOBREX kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

TOBREX merhem yatmadan önce, gün içerisinde kullanılan TOBREX göz damlası, çözelti ile eş zamanlı kullanılabilir.

Bir aminoglikozid ile (tobramisin gibi) sinir sistemi, kulak veya böbreğe toksik (zarar verici) etkileri olan diğer ağızdan alınan, vücuda etki eden veya yüzeysel kullanılan ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı bu zararlı etkilerin artmasına neden olabilir, mümkün olduğunda bu tür birlikte kullanımlardan kaçınılmalıdır.

TOBREX ile kombine olarak kullanılan topikal kortikosteroidler bakteriyel, fungal veya viral infeksiyonların klinik belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını baskılayabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. TOBREX nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

TOBREX'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hafif-orta dereceli infeksiyonlarda normal doz günde iki-üç kez az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhemdir.



Ciddi infeksiyonlarda normal doz ilk iki gün üç ila dört saatte bir az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhem, daha sonra düzelme oluncaya kadar günde iki veya üç uygulamadır.

Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devam ediniz.

TOBREX'i sadece gözlerinize kullanınız.

Başka göz ilacı kullanıyorsanız TOBREX'i kullanmadan en az 10-15 dakika bekleyiniz.

## Uygulama yolu ve metodu:



1. TOBREX t p n  ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. T p n kapađını aınız.
4. T p  bař ve iřaret parmađınızın arasında tutunuz.
5. Bařınızı arkaya eđiniz. Temiz bir parmakla alt g z kapađınızı, g z kapađınız ve g zünüz arasında bir “kese” oluřuncaya kadar ařađı dođru ekiniz. Merhem buraya s r lecektir (řekil 1).
6. T p n ucunu g z n ze yaklařtırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.
7. T p n ađzını g z n ze veya g z kapađınıza, g z n z n evresine veya bařka y zeylere deđdirmeyiniz. Merheme mikrop bulařabilir.
8. Merhem řeridini ıkarmak iin t pe yavařa bastırınız (řekil 2).
9. TOBREX’i kullandıktan sonra g z kapađınızı bırakınız ve merhemin g z n t m y zeyine yayıldıđından emin olmak iin bir ka kez g z kırınız. G zlerinizi yavařa kapatınız; bu TOBREX’in v cudun geri kalan kısmına gemesini engelleyecektir.
10. Eđer merhemi iki g z n ze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diđer g z n z iin de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra t p n kapađını sıkıca kapatınız.
12. Sadece birer t p kullanınız.

Bařka g z damlası veya g z merhemi gibi ilaları kullanıyorsanız, her ila arasında en az 5 dakika bırakınız. G z merhemleri en son uygulanmalıdır.

Eđer merhemi g z n ze s remediyseniz tekrar deneyiniz.

## Deđiřik yař grupları:

### ocuklarda kullanımı:

Bir yař ve  zeri ocuklarda  zel bir kullanımı yoktur, doz yetiřkinler ile aynıdır. 1 yařın altındaki ocuklar iin etkililik ve g venlilik bilgisi mevcut deđildir.

### Yařlılarda kullanımı:

Yařlılarda kullanımı yetiřkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

###  zel kullanım durumları:

#### B brek/Karaciđer yetmezliđi:

TOBREX’in, b brek/karaciđer yetmezliđindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak, tobramisinin y zeysel uygulamasından sonra sistemik emilimiok az olduđu iin doz ayarlaması gerekli deđildir.

*Eđer TOBREX’in etkisinin ok g cl  veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBREX kullandıysanız:**

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak TOBREX'i uzaklaştırabilirsiniz.

*TOBREX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**TOBREX'i kullanmayı unutursanız:**

Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulmuş dozu almayı düzenli doz programınıza devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

**TOBREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, TOBREX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, TOBREX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları; göz kapağında kaşıntı veya şişme, gözde kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. İleri düzeyde ise deride döküntü, ses kısıklığı, yutkunmada zorluk, öksürük, nefes darlığı, yüz ve dilde şişme, çarpıntı ve baş dönmesinin görüleceği anafilaktik reaksiyon denilen hayatı tehdit edici duruma dönüşebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TOBREX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.**

**Yaygın:**

- gözde rahatsızlık hissi
- göz içinde kızarıklık
- göz alerjisi
- göz kapağı kaşıntısı

**Yaygın olmayan:**

- gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
- korneada aşınma
- göz kapağında kızarıklık
- göz akıntısı
- göz kapağında ödem
- kuru göz
- konjonktivada (göz kapaklarının iç ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan ince ve şeffaf bir zar) ödem
- göz kaşıntısı
- göz ağrısı
- görme bozukluğu
- aşırı duyarlılık
- baş ağrısı
- kurdeşen
- dermatit (bir tür deri hastalığı)
- kaş ve kirpik dökülmesi
- lökodermi (deride açık renkli yama tarzı lekeler)
- kaşıntı
- deride kuruluk
- bulanık görme
- gözyaşında artış

**Bilinmiyor:**

- göz iritasyonu
- ciddi allerjik reaksiyon
- ciddi deri reaksiyonları (Vücutta simetrik olarak hedef tahtasına benzer; merkezde daha koyu renkli ve dışa doğru rengi açılan kızarıklık şeklinde döküntülerin görüldüğü Eritema multiforme ve vücutta yaygın su toplamaları ve ateşin görüldüğü Stevens-Johnson sendromu)
- göz alerjisi
- kaşıntılı göz kapağı
- ciltte kızarıklık

**Bunlar TOBREX'in hafif yan etkileridir.** Bu hafif yan etkiler oldukça seyrek görülür.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması:**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## 5. TOBREX'in saklanması

*TOBREX'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.** *Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOBREX'i kullanmayınız.*

Kullanmadığınız zaman tüpün kapađını sıkıca kapatınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız.

Ürün açılıncaya kadar sterilidir. Şişe ilk kez açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Orjinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

**Ruhsat Sahibi:** Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Kavacık /Beykoz /İstanbul

**Üretim yeri:** S.A. ALCON Couvreur N.V. ,  
Rijksweg 14/ Puurs / Belçika

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*