

KULLANMA TALİMATI

SLEZOL FORTE 1 mg/ml + 3 mg/ml Göz Damlası

Steril

Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin maddeler:** Her 1 ml'de 1.00 mg dekstran 70 ve 3.00 mg hipromelloz (hidroksipropilmetilselüloz, E464)
- **Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum klorür, sodyum klorür, potasyum klorür (E 508), disodyum EDTA ve enjeksiyonluk su. Çok az miktarda sodyum hidroksit veya hidroklorik asit asidite seviyelerini (pH seviyelerini) normal tutmak için eklenir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***SLEZOL FORTE nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***SLEZOL FORTE'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***SLEZOL FORTE nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***SLEZOL FORTE'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. SLEZOL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

SLEZOL FORTE berrak, renksiz, pratik olarak partikülsüz, çözeltilidir.

SLEZOL FORTE etkin madde olarak dekstran 70 ve hipromelloz içerir.

SLEZOL FORTE göz damlası, LDPE, HDPE kapak ile kapatılan, beyaz LDPE damlalıklı, 15 ml'lik beyaz opak LDPE şişelerde sunulmaktadır.

SLEZOL FORTE kuru göz hastalığını tedavi etmek ve bu durumla ilgili yanma ve batma gibi tahriş şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile kullanılır. Ayrıca, gözde oluşan küçük tahrişler veya güneş ya da rüzgara maruz kalma sonucu oluşan rahatsızlık hissini geçici olarak gidermede kullanılır.

Göz kuruluğu: Gözyaşınız, gözyaşı filmi diye adlandırılan göz yüzeyindeki koruyucu tabaka ile birleşen doğru miktarlarda doğal bileşenleri içerir. Gözyaşı filmi gözlerin sağlıklı ve rahat olmasını sağlamak amacıyla her gün gözü sarar ve ıslatır. Bazı insanlarda çok az miktarlarda normal gözyaşı vardır. Gözyaşı azlığı veya eksikliği gözyaşı filminin bozulmasına ve göz yüzeyinde kuru noktaların oluşmasına neden olabilir. Bu durumda yanma, batma, yorgunluk hissi gibi kuru ve hassas göz semptomlarına neden olarak, gözde ışığa duyarlılığa veya rahatsızlık hissine sebep olur.

SLEZOL FORTE suni gözyaşı olarak adlandırılan ilaç grubunda yer almaktadır.

2. SLEZOL FORTE’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SLEZOL FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- SLEZOL FORTE’un içerdiği maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

SLEZOL FORTE’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

SLEZOL FORTE’u sadece gözlerinize damlatmak için kullanınız.

Eğer uygulama esnasında baş ağrısı, gözde ağrı, görmede değişme, uzun süren kızarıklık veya gözde iritasyon (rahatsızlık hissi) oluşursa veya durumunuz kötüleşir ya da 3 gün içinde düzelmezseniz uygulamayı kesmeli ve doktorunuza başvurmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SLEZOL FORTE'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Ürün önerildiđi Őekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve ieceklerle bir iliŐkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

SLEZOL FORTE hamilelik süresince kullanılabilir.

Tedavi sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıŐınız.

SLEZOL FORTE emzirme süresince kullanılabilir.

Ara ve makine kullanımı

SLEZOL FORTE kullandıktan hemen sonra görüŐünüzde bulanıklaŐma olabilir. Bulanıklık geinceye kadar ara ya da makine kullanmayınız.

SLEZOL FORTE'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SLEZOL FORTE göz damlası benzalkonyum klorür iermektedir. Benzalkonyum klorür gözde irritasyona sebebiyet verebilir. YumuŐak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lens ıkartınız ve lensi takmak iin en azından 15 dakika bekleyiniz. Benzalkonyum klorürün yumuŐak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduđu bilinmektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

BaŐka topikal oküler ilalarla da tedavi görüyorsanız, birbirini takip eden iki uygulama arasında 10 ila 15 dakika ara vermelisiniz. Göz pomadları en son kullanılmalıdır.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı Őu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SLEZOL FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:


Göz kuruluđu belirtilerini veya tahriŐi rahatlatma ihtiyacınız olduđunda göz(ler)e bir-iki damladır. Ancak, sizin özel durumunuza uyması amacıyla doktorunuzun dozu deđiŐtirme olasılıđı vardır.

Sadece doktorunuz size talimat verdi ise SLEZOL FORTE’u iki gözünüze de kullanınız. Doktorunuzun size talimat verdiği süre boyunca kullanınız.


SLEZOL FORTE’u sadece gözünüze damlatma amacıyla kullanınız.

Damla ve şişenin ucunun kirlenmesini önlemek için göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmuyunuz. Kullanmadığınız zaman şişeyi sıkıca kapatınız.


Uygulama yolu ve metodu:



1



2



3

1. SLEZOL FORTE şişesini ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Kapağını açınız.
4. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi baş parmağınız ve diğer parmaklarınızla tutunuz (resim 1).
5. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 2).
6. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.
7. Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmuyunuz. Damlayı kirletebilir.
8. İşaret parmağınızla aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe sıkmanız bir damla SLEZOL FORTE damlamasını sağlayacaktır (resim 3).
9. SLEZOL FORTE’u kullandıktan sonra, alt göz kapağınızı serbest bırakınız, bir parmağınızı gözünüzün iç köşesine bastırınız. Bu, SLEZOL FORTE’un vücudun geri kalanına geçmesini engeller.
10. Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

12. Her defasında sadece bir şişe kullanınız.

Eğer damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ürünün çocuklarda kullanımı ile ilgili ayrıntılı veriler bulunmamaktadır. Ancak uzun süreli deneyimler dikkate alındığında, bu tip hastalar için bu ürünün formülasyonunda yer alan etkin madde ve yardımcı maddeleri içeren ve gözde kullanım için kullanılan tıbbi ürünlerde doz ayarlaması gerekli değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu ürünün yaşlılarda kullanımı ile ilgili ayrıntılı veriler bulunmamaktadır. Ancak uzun süreli deneyimler dikkate alındığında, bu tip hastalar için bu ürünün formülasyonunda yer alan etkin madde ve yardımcı maddeleri içeren ve gözde kullanım için kullanılan tıbbi ürünlerde doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

SLEZOL FORTE’u kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer SLEZOL FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SLEZOL FORTE kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla SLEZOL FORTE kullandıysanız endişelenmeyiniz, ılık su ile yıkayarak gözümüzden uzaklaştırılabilir. Bir sonraki kullanıma kadar gözünüze başka damla uygulamayınız.

SLEZOL FORTE’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SLEZOL FORTE’u kullanmayı unutursanız:

Diğer doza planlandığı şekilde devam ediniz. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulmuş dozu almayıp normal doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SLEZOL FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Geçerli değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SLEZOL FORTE'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan SLEZOL FORTE kullanımını kesmeyiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

SLEZOL FORTE kullanıldığında aşağıdaki istenmeyen yan etkiler görülebilir:

Çok yaygın görülen yan etkiler:

- Bulanık görme.

Yaygın görülen yan etkiler:

- Gözde kuruluk
- Göz kapağı bozuklukları
- Gözde hassasiyet
- Gözde yabancı cisim hissi
- Gözde rahatsızlık

Yaygın olmayan yan etkiler:

- Gözde kaşıntı
- Gözde tahriş veya kızarıklık
- Işığa karşı hassasiyet

- Bař ađrısı
- Deride rahatsızlık hissi

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

- Gz kapađında kızarıklık
- Gzde ađrı veya řiřme
- Gzde akma
- Gzde apaklanma
- Gz kapađında kabuklanma
- Gz yařı salgısında artıř
- Alerji (ařırı hassasiyet)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıđınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İla Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

5. SLEZOL FORTE’un saklanması

SLEZOL FORTE’u ocukların gremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SLEZOL FORTE’u kullanmayınız. řiřeyi atıđınız tarihi ařađıdaki blme yazınız.

Aıldıđı tarih:

Kullanmadıđınız zaman řiřenin kapađını sıkıca kapatınız.

“Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları pe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

25°C’nin altındaki oda sıcaklıđında saklanmalıdır.

Dondurmayınız.

İnfeksiyonun nlenmesi iin, **řiře ilk kez aıldıktan sonra 28 gn iinde kullanılmalıdır.**

Renk deęişiklięi ya da bulanıklık hissederseniz ürünü **kullanmayınız**.
Kapaktaki güvenlik kilidi açılmışsa SLEZOL FORTE’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Baęcılar/İstanbul

Üretim Yeri: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Baęcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı 07.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.