

KULLANMA TALİMATI

ANFEZİNC-G Şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 mL (1 ölçek) şurup 40 mg demir (demir glukonat halinde), 15 mg çinko (çinko glukonat halinde) içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit, sorbitol, sodyum sakarin, gliserin, sodyum benzoat, ahududu esansı ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

- 1- **ANFEZİNC-G nedir ve ne için kullanılır?**
- 2- **ANFEZİNC-G'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3- **ANFEZİNC-G nasıl kullanılır?**
- 4- **Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5- **ANFEZİNC-G 'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1 - ANFEZİNC-G nedir ve ne için kullanılır?

ANFEZİNC-G, 100 mL'lik amber renkli cam şişede, 5 mL'sinde 40 mg demir (demir glukonat halinde) 15 mg çinko (çinko glukonat halinde) içeren şuruptur.

ANFEZİNC-G, değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliğine bağlı kansızlık (anemi) tedavisinde ve demir eksikliğine bağlı kansızlıkta görülen çinko eksikliğinde kullanılır.

2 - ANFEZİNC-G'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler **ANFEZİNC-G'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığınız varsa;
- Kurşun anemisi veya akdeniz anemisi hastalığınız varsa;
- Demir eksikliğinin neden olmadığı aneminiz (B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi) varsa;
- Düzenli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa;

- HIV enfeksiyonunuz varsa;
- Demir eksikliđiniz klinik olarak kesinleřtirilmemiřse;

ANFEZİNC-G'yi ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer;

Çocuđunuzda demir eksikliđine bađlı olmayan kansızlık varsa doktora danıřmadan kullanmayınız.

Mide ülseriniz varsa doktor kontrolünde kullanınız.

Hamilelik durumunda doktora danıřmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

ANFEZİNC-G'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması:

ay, kahve, süt, peynir, yumurta demir ve inko emilimini azaltacađından birlikte kullanmayınız. ANFEZİNC-G'yi yukarıdaki besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.

Hamilelik:

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Hamilelik döneminde gerekli olduđu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

Emzirme:

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- ANFEZİNC-G süte geebileceđi için emzirme döneminde gerekli olduđu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Ara ve makine kullanımı:

Ara ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur

ANFEZİNC-G'nin ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.

İeriđinde bulunan sorbitol nedeniyle, eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmiřse ANFEZİNC-G'yi almadan önce doktorunuza danıřınız.

Bu tıbbi ürün her 5 mL' lik dozunda 1 mmol (23 mg)' dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bađlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

ANFEZİNC-G ařađıdaki ilalar ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır;

- Mide asidini azaltan antiasit ilalar (magnezyum trisilikat ve karbonat)
- Bazı ađrı kesici ilalar (salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazon)
- Bazı iltihap önleyici ilalar (tetrasiklin)
- Bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilalar (ađızdan alınan oral altın bileřikleri)

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 - ANFEZİNC-G nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda ANFEZİNC-G' yi çocuklarda 2-3 doza bölerek aşağıdaki gibi kullanınız.

Hastanın yaşı	Verilecek miktar
6 – 12 ay	1 – 1.5 mL
1 – 3 yaş	1.5 – 2.5 mL
4 – 8 yaş	3 – 5 mL
9 – 12 yaş	5 – 7.5 mL
13 – 18 yaş	5 – 10 mL

- Ciddi demir yetersizliğine bağlı kansızlıklarda: günde 4 kez 5 mL kullanınız.
- Yapılan kan tahlilinde, doktorunuz kan değerlerinizin normale döndüğünü söyleyinceye kadar aynı dozda kullanmaya devam ediniz. Daha sonra 2 ay süreyle günde 2 kez 5 mL kullanınız.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

ANFEZİNC-G sadece ağızdan kullanım içindir.

- Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra ölçek kaşığı veya pipet kullanılabilir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda Kullanım:

ANFEZİNC-G'nin yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ANFEZİNC-G'yi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

Eğer ANFEZİNC-G'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ANFEZİNC-G kullandıysanız:

ANFEZİNC-G'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme (hipotansiyon).

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlılıkla 60 mg/kg dozunda (1.5 kaşık/kg veya pipetle 7.5 ml/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)' ni arayınız.

ANFEZİNC-G'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen doza yeniden almaya devam ediniz.

ANFEZİNC-G ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ANFEZİNC-G'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANFEZİNC-G'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Yüz, dil, boğazda şişme
- Nefes darlığı, hırıltılı soluma
- Kan basıncında aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı
- Kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı, deri döküntüleri

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin ANFEZİNC-G'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Katran renkli dışkı yada dışkıda açık renkli kan olması
- Şiddetli mide ağrısı ile beraber kusma olması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- İshal
- Bulantı
- Karında mide bölgesinde ağrı
- Mide yanması
- Midede şişkinlik
- Kabızlık
- Kusma
- Dışkı renginin koyulaşması
- Dişlerin koyu renk boyanması

Bunlar ANFEZİNC-G'nin hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5 - ANFEZİNC-G'nin Saklanması

ANFEZİNC-G'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce ANFEZİNC-G'yi kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ANFEZİNC-G'yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks: 0216 456 65 79

e-mail: info@beratberan.com.tr

Üretim Yeri: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres: Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon: 0 216 592 33 00

Faks: 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı 27/08/2012 tarihinde onaylanmıştır.