

## KULLANMA TALİMATI

### DEXDERM %5 krem

#### Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her 1 g krem 50 mg dekspantenol içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Klorhekzidin dihidroklorür, setil alkol, stearil alkol, sıvı parafin, peg-40 stearat, lanolin (koyun yününden elde edilen), vazelin, saf su.

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DEXDERM'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DEXDERM nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DEXDERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DEXDERM nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DEXDERM'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DEXDERM nedir ve ne için kullanılır?**

- DEXDERM, etkin madde olarak dekspantenol içerir ve beyaz, pütürsüz, homojen görünümlü kremdir.
- 30g krem içeren HDPE kapaklı alüminyum tüpte, kullanma talimatı ile birlikte karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
- Enfeksiyon riski olan tüm yüzeysel yara türleri, bacak ülseri ve dekübit ülser (yatak yarası) gibi kronik yaralar, cilt enfeksiyonları, emziren annelerde çatlak meme uçlarının tedavisi ve anüs çatlakları tedavisi, doku harabiyeti, cerrahi yaralar, bebek bezleri nedeniyle oluşan eritem (kızarıklık) ve tahriş olmuş derinin onarılması için kullanılır.
- Derinin daha hızlı ve daha düzgün bir dokuyla kapanmasına yardımcı olur.
- Cildi esnek ve nemli tutar.

#### **2. DEXDERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

#### **DEXDERM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- DEXDERM'in içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa

kullanmayınız.

### **DEXDERM'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Güz, kulak ve vücudun ađız, vajina gibi alanlarına kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **DEXDERM'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Uygulama yöntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik**

DEXDERM hamilelik dönemi boyunca kullanılabilir ancak geniş deri yüzeyine uygulanmamalıdır.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.*

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

### **Emzirme**

Meme bařındaki atlakların tedavisi için emzirme döneminde kullanılıyorsa emzirmeden önce temizlenmelidir.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.*

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

### **DEXDERM'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DEXDERM'in ieriđinde bulunan setil alkol, stearil alkol ve lanolin lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

DEXDERM'in deri üzerine önerildiđi řekilde kullanımında herhangi bir ila etkileřimi bildirilmemiřtir.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DEXDERM nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:**

Yara ve yanıklarda: DEXDERM günde bir iki kez veya gerekli görüldüđü takdirde daha sık uygulanır.

Emziren annelerin meme bakımında ve ađrılı, atlamıř meme bařlarını iyileřtirir. DEXDERM her emzirmeden sonra meme bařlarına sürülür. Emzirmeden önce meme bařı su ile temizlenmelidir.

Piřiklerde: Her bez deđiřiminde DEXDERM uygulanır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

DEXDERM, deri üzerinde tahriř olmuř bölgeye ince bir tabaka halinde mümkünse hafife oyuřturularak sürülür.

## Değişik yaş grupları

### Çocuklarda kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

### Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

## Özel kullanım durumları

### Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

*Eğer DEXDERM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.*

### Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXDERM kullandıysanız:

Deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullanmanız halinde herhangi bir istenmeyen etki görülmesi beklenmemektedir.

*DEXDERM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### DEXDERM'i kullanmayı unutursanız:

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

### DEXDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

## 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEXDERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu etkiler herkeste görülmez.

Dekspantenol ile gözlenen yan etkiler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır, çok yaygın ( $\geq 1/10$ ); yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ ); yaygın olmayan ( $\geq 1/1000$  ila  $< 1/100$ ); seyrek ( $\geq 1/10.000$  ila  $< 1/1.000$ ); çok seyrek ( $< 1/10.000$ ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

### Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar ve temas dermatiti (bir tür deri hastalığı) gibi alerjik deri reaksiyonları, alerjik dermatit (bir tür deri hastalığı), kaşıntı, deride kızarıklık (eritem), kaşıntıyla beraber kabarcıkların oluşması (egzama), isilik, ürtiker (kurdeşen), deri hassasiyeti ve sıvı dolu kabarcıkların oluşması

### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. DEXDERM'in saklanması**

*DEXDERM'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXDERM'i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eđer ambalajların hasar gördüğünü fark ederseniz DEXDERM'i kullanmayınız.

### ***Ruhsat sahibi:***

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mermerciler San. Sit. 2. Cadde No:3

Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye

Telefon: (0212) 438 70 85

Faks : (0212) 438 70 87

### ***Üretim yeri:***

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye

*Bu kullanma talimatı 14/05/2019 tarihinde onaylanmıştır.*