

KULLANMA TALİMATI

TOBRİNEX %0.3 göz merhemi

Göze sürülerek uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** 1 g'da 3 mg tobramisın
- **Yardımcı maddeler:** Anhidr klorbutanol, likid parafin, vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***TOBRİNEX nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***TOBRİNEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***TOBRİNEX nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***TOBRİNEX'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. TOBRİNEX nedir ve ne için kullanılır?

TOBRİNEX, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

TOBRİNEX anti-infektifler adı verilen ilaç grubunda yer almaktadır. Anti-infektifler grubu göz(ler)e hastalık bulaştıran mikroorganizmaların büyük bir kısmına karşı aktif olan antibiyotikleri (bu üründe tobramisın) içerir.

TOBRİNEX 3.5 g'lık oftalmik tüplerde sunulan steril bir merhemdir.

2. TOBRİNEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TOBRİNEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

- Tobramisine veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise

TOBRİNEX’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eęer,

- Tobrinex kullanımı ile alerjik reaksiyonlar geiriyorsanız, ila kullanımına son veriniz ve doktorunuza bařvurunuz. Alerjik reaksiyonlar lokal kařıntı ya da deri kızarıklığından řiddetli alerjik reaksiyonlara (anaflaktik reaksiyonlar) ya da ciddi deri reaksiyonlarına kadar deęişkenlik gösterebilir. Bu alerjik reaksiyonlar aynı ila grubundan olan (aminoglikozidler) dięer topikal (yüzeysel) ve sistemik etkili antibiyotiklerle de görülebilir.
- Bazı hastalarda yüzeysel (topikal) olarak uygulanan aminoglikozidlere (antibiyotikler) karřı aşırı duyarlılık oluşabilmektedir. Dięer aminoglikozid sınıfı antibiyotiklere de apraz-duyarlılık ayrıca oluşabilmektedir. Eęer ciddi alerjik reaksiyon belirtileri oluşursa, tedaviyi durdurunuz.
- Tobrinex ile birlikte bařka antibiyotik tedavileri de kullanıyorsanız, doktorunuza sorunuz.
- Sistemik aminoglikozid antibiyotik tedavisi ile birlikte kullanıldığında ürünün kulak, böbrek ve sinirlerde birikimine baęlı olarak oluşabilecek kulakta ınlama, iřitme kaybı, bař dönmesi, denge bozukluğu, idrar ıkışında azalma, idrarda kan ve vücutta řişlik gibi belirtilerin görüleceęi zehirlenme etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.
- Tüm antibiyotik ilalarda olduęu gibi, uzun süre kullanımı duyarlı olmayan bakterilerin ve mantarların (ilaca diren geliřtiren organizmalar) artmasına neden olabilir, eęer böyle bir süperinfeksiyon (herhangi bir infeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir infeksiyonun bařlaması) geliřirse, uygun tedavi bařlatılmalıdır.
- Bir göz infeksiyonunun tedavisi süresince kontakt lens kullanımı önerilmemektedir. Bu ürünle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.
- Bu ilacı doktorunuzun önerdięi süre boyunca kullanınız.
- Hastalığınız kötüleřirse veya hastalık belirtileri tekrar ortaya ıkarsa doktorunuza danıřınız.
- Göz merhemleri korneadaki yaraların iyileřmesini geciktirebilir.
- Göz infeksiyonlarının tedavisi sırasında, kontakt lens takılması önerilmez, zira tedavi esnasında kullanımı mevcut durumunuzu daha da kötüleřtirebilir. Bu ürünle tedavi olurken kontakt lens kullanmayınız.
- Bařka ilalar kullanıyorsanız, lütfen ‘Dięer ilalar ile birlikte kullanımı’ bölümünü okuyunuz

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız

TOBRİNEX’in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Ürün önerildięi řekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve ieceklerle etkileřme göstermesi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuzun tedavinize karar vermesi gerekmektedir ve kesinlikle gerekli olmadıka kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlaçların bir çoğu anne sütüne geçebilir, bu nedenle emziriyorsanız ilacı kullanmayınız.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

TOBRİNEX kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma olursa bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

TOBRİNEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün uyarı gerektirecek herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TOBRİNEX merhem yatmadan önce, gün içerisinde kullanılan TOBRİNEX göz damlası, çözelti ile eş zamanlı kullanılabilir.

Bir aminoglikozid ile (tobramisin gibi) sinir sistemi, kulak veya böbreğe toksik (zarar verici) etkileri olan diğer ağızdan alınan, vücuda etki eden veya yüzeysel kullanılan ilaçların eş zamanlı ve/veya ardışık kullanımı bu zararlı etkilerin artmasına neden olabilir, mümkün olduğunda bu tür birlikte kullanımlardan kaçınılmalıdır.

TOBRİNEX ile kombine olarak kullanılan topikal kortikosteroidler bakteriyel, fungal veya viral enfeksiyonların klinik belirtilerini maskeleyebilir ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını baskılayabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TOBRİNEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TOBRİNEX'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Hafif-orta dereceli enfeksiyonlarda normal doz günde iki-üç kez az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhemdir.



Ciddi enfeksiyonlarda normal doz ilk iki gün üç ila dört saatte bir az bir miktar (yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda şerit) merhem, daha sonra düzelme oluncaya kadar günde iki veya üç uygulamadır.

Tedavinin normal süresi 7-10 gündür. Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devam ediniz.

TOBRİNEX'i sadece gözlerinize kullanınız.

Başka göz ilacı kullanıyorsanız TOBRİNEX'i kullanmadan en az 10-15 dakika bekleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:



1. TOBRİNEX t p n  ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. T p n kapađını a ınız.
4. T p  bař ve iřaret parmađınızın arasında tutunuz.
5. Bařınızı arkaya eđiniz. Temiz bir parmakla alt g z kapađınızı, g z kapađınız ve g z n z arasında bir "kese" oluřuncaya kadar ařađı dođru  ekiniz. Merhem buraya s r lecektir (resim 1).
6. T p n ucunu g z n ze yaklařtırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.
7. T p n ađzını g z n ze veya g z kapađınıza, g z n z n  evresine veya bařka y zeylere deđdirmeyiniz. Merheme mikrop bulařabilir.
8. Merhem řeridini  ıkarmak i in t pe yavařça bastırınız (řekil 2).
9. TOBRİNEX'i kullandıktan sonra g z kapađınızı bırakınız ve merhemin g z n t m y zeyine yayıldıđından emin olmak i in bir ka  kez g z kırpınız. G zlerinizi yavařça kapatınız; bu TOBRİNEX'in vucudun geri kalan kısmına ge mesini engelleyecektir.
10. Eđer merhemi iki g z n ze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diđer g z n z i in de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra t p n kapađını sıkıca kapatınız.
12. Sadece birer t p kullanınız.

Eđer merhemi g z n ze s remediyseniz tekrar deneyiniz.

Deđiřik yař grupları:

 ocuklarda kullanımı:

Bir yař ve  zeri  ocuklarda  zel bir kullanımı yoktur, doz yetiřkinler ile aynıdır. 1 yařın altındaki  ocuklar i in etkililik ve g venlilik bilgisi mevcut deđildir.

Yařlılarda kullanımı:

Yařlılarda kullanımı yetiřkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

 zel kullanım durumları:

B brek/Karaciđer yetmezliđi:

TOBRİNEX'in, b brek/karaciđer yetmezliđindeki etkileri bilinmemektedir. Ancak, tobramisinin y zeysel uygulamasından sonra sistemik emilimi  ok az olduđu i in doz ayarlaması gerekli deđildir.

Eđer TOBRİNEX'in etkisinin  ok g cl  veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TOBRİNEX kullandıysanız:

Eğer gerekirse, gözünüzü/gözlerinizi ılık su ile yıkayarak TOBRİNEX'i uzaklaştırabilirsiniz.

TOBRİNEX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TOBRİNEX'i kullanmayı unutursanız:

Hatırladığınız anda tek bir doz kullanınız. Bir sonraki dozun zamanı yakınsa unutulmuş dozu almayıp düzenli doz programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

TOBRİNEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TOBRİNEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birini farkederseniz, olursa, DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları; (göz kapağında kaşıntı veya şişme, gözde kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. İleri düzeyde ise deride döküntü, ses kısıklığı, yutkunmada zorluk, öksürük, nefes darlığı, yüz ve dilde şişme, çarpıntı ve baş dönmesinin görüleceği anafilaktik reaksiyon denilen hayatı tehdit edici duruma dönüşebilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:	100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:	1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	:	10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

- gözde rahatsızlık hissi
- göz içinde kızarıklık
- göz alerjisi
- göz kapağı kaşıntısı

Yaygın olmayan:

- gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
- korneada aşınma
- göz kapağında kızarıklık
- göz akıntısı
- göz kapağında ödem
- kuru göz

- konjonktivada (göz kapaklarının iç ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan ince ve şeffaf bir zar) ödem
- göz kaşıntısı
- göz ağrısı
- görme bozukluğu
- aşırı duyarlılık
- baş ağrısı
- kurdeşen
- dermatit (bir tür deri hastalığı)
- kaş ve kirpik dökülmesi
- lökodermi (deride açık renkli yama tarzı lekeler)
- kaşıntı
- deride kuruluk
- bulanık görme
- gözyaşında artış

Bilinmiyor:

- göz iritasyonu
- ciddi allerjik reaksiyon
- ciddi deri reaksiyonları (Vücutta simetrik olarak hedef tahtasına benzer; merkezde daha koyu renkli ve dışı doğru rengi açılan kızarıklık şeklinde döküntülerin görüldüğü Eritema multiforme ve vücutta yaygın su toplamaları ve ateşin görüldüğü Stevens-Johnson sendromu)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. TOBRİNEX’in saklanması

TOBRİNEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TOBRİNEX’i kullanmayınız. Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.

Kullanmadığınız zaman tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız.

Ürün açılıncaya kadar sterilidir. Tüp ilk kez açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları öpe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıđınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İla San. ve Tic.A.ř.

Reřitpařa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467

Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İla San. ve Tic. A.ř.

Orhangazi Mahallesi, Tun Caddesi, No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı/... tarihinde onaylanmıřtır.