

KULLANMA TALİMATI

BECONASE™ Nazal Sprey **Buruna uygulanır.**

Etkin madde: Her püskürtmede (100 mg) 50 mikrogram beklometazon dipropiyonat içerir.
Yardımcı maddeler: Oleik asit, triklorflorometan, diklordiflorometan

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BECONASE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BECONASE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BECONASE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BECONASE'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BECONASE nedir ve ne için kullanılır?

BECONASE, karton kutu içinde 200 doz içeren ölçülü dozlu aerosol tüp halinde bulunur.

BECONASE, solunum yollarında iltihap giderici etkiye sahip bir kortikosteroiddir.

Yıl boyunca devam eden nezle, saman nezlesi, mevsimsel alerjik nezlenin ve burun mukozasında görülen tıkanıklığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

2. BECONASE'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BECONASE'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer BECONASE'ın içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
- 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

BECONASE'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Mevsimsel ve uzun süreli rinit tedavisinde üç hafta kullanmanıza rağmen belirtilerde önemli düzelme olmazsa BECONASE kullanımına son veriniz.

- Eğer burun yollarında ve sinüslerde enfeksiyonunuz varsa, bu durum yara iyileşmesini geciktireceğinden uygun olarak tedavi edilmelidir.
- Eğer sistemik kortikosteroid tedavisi görüyorsanız ve BECONASE tedavisine başlayacaksınız, böbrek üstü bezinin işlevlerinin etkilendiğini düşündürecek (yorgunluk, kilo kaybı iştahsızlık, deri ve mukozanın renginin değişmesi v.b.) varsa,
- Burun ameliyatı sonrası ve burunda yaralar bulunması halinde yara iyileşmesini geciktirebileceğinden yara iyileşene dek BECONASE kullanılmamalıdır.
- Eğer BECONASE'dan kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süre kullanmışsanız veya özel hassasiyetiniz varsa veya yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış iseniz, BECONASE sistemik etkilere (yorgunluk, kilo kaybı iştahsızlık, deri ve mukozanın renginin değişmesi v.b.) yol açabilir.
- Ağır yaz alerjenlerine maruz kalmışsanız özellikle göz belirtileri için ilave tedavi almanız gerekebilir.
- 6 yaş üzeri çocuklarda kullanımı büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Uzun süreli kullanımlarda doktor gözetiminde olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BECONASE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BECONASE'in gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden büyük ise düşünülmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Süt veren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı yararları ile karşılaştırılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Veri yoktur.

BECONASE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki uyarı gerektirecek yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Veri yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BECONASE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler ve 6 yaşın üstündeki çocuklar için kullanım, günde iki kez her burun deliğine iki püskürtmedir. Ayrıca her burun deliğine günde 3 veya 4 kez birer püskürtme yapılabilir. Ancak günlük toplam doz 8 püskürtmeyi geçmemelidir.

Tam bir tedavi için düzenli kullanınız. Dozlama kurallarına uymalısınız, ilk birkaç uygulamadan sonra maksimum rahatlama göreceksiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Burun içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımını önermek için klinik bilgiler yetersizdir.

Yaşlılarda kullanımı: Veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer BECONASE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BECONASE kullandıysanız:

Yüksek miktarlarda BECONASE'a maruz kalmışsanız, görülebilecek tek zararlı etki kısa bir periyotta hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) fonksiyonunun baskılanmasıdır. Özel ilk yardım önlemleri gerekmez. Böyle bir durumda BECONASE ile tedaviye önerilen dozlarda devam etmelisiniz. HPA fonksiyonu bir iki günde eski haline döner.

BECONASE'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BECONASE'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BECONASE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

BECONASE'ı doktorunuzun söylediği sürede kullanın. Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etkinin görülmesi beklenmez.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BECONASE'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BECONASE'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar; döküntü, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı, kızarıklık, gözlerde, yüzde, dudaklarda ve boğazda şişlik, ani aşırı duyarlılık tepkileri ve bronşların daralmasıyla kendini gösterir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BECONASE'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Hoş olmayan tat ve koku
- Göz içi basıncında artış ve göze perde inmesi
- Burun kanaması
- Burun kuruluğu ve tahrişi
- Boğaz kuruluğu ve tahrişi
- Nazal septal perforasyon (burun boşluğunu ikiye bölen duvarda görülen hasar)

Bunlar BECONASE'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BECONASE'ın Saklanması

BECONASE'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C'nin altında saklayınız. Direk gün ışığından ve donmaktan koruyunuz.

İlacın etkisi aerosol tüpü soğuk olduğunda azalabilir.

Boş aerosol tüplerini ezmeyiniz, kırmayınız ya da yakmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra BECONASE'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza
B Blok 34394 1.Levent/İstanbul

Üretici: Glaxo Wellcome Operations, İngiltere

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıştır.

KT 02 15.02.2012 GDS15