

KULLANMA TALİMATI

FUCİDOX %2 pomad

Haricen kullanılır.

Etkin madde: Bir gram pomad, 20 mg sodyum fusidat içerir.

Yardımcı maddeler: Susuz lanolin, setil alkol, sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***FUCİDOX nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***FUCİDOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***FUCİDOX nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***FUCİDOX'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. FUCİDOX nedir ve ne için kullanılır?

FUCİDOX beyaza yakın renkte, viskoz (az akışkan) pomad içeren 20 g'lık alüminyum tüplerde kullanıma sunulmaktadır.

FUCİDOX'un etkin maddesi olan sodyum fusidat; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

FUCİDOX'a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. FUCİDOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCİDOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Etkin maddeye veya içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
- *Pseudomonas aeruginosa* gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlar var ise kullanmayınız.

FUCİDOX' u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ařađıdaki durumlarda size veya ocuđunuza FUCİDOX kullanılıp kullanılmayacađına doktorunuz karar verecektir.

- Gzde irritasyona sebep olabileceđinden gz vresindeki cilt enfeksiyonlarında
- Btn diđer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduđu gibi, uzun sreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılıđı ve antibiyotiđe karřı diren gelişmesi riski olduđunda.
- Aık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

“Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.”

FUCİDOX'un yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyecek ve iecek ile etkileřimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

FUCİDOX'un gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/zarar iliřkisi hekimce etraflı olarak deđerlendirmek kořulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

FUCİDOX'un emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/zarar iliřkisi hekimce etraflı olarak deđerlendirmek kořulu ile kullanılmalıdır.

Emzirenlerde meme bařı vresine uygulanmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımı zerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiřtir.

FUCİDOX'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

FUCİDOX'un ieriđinde bulunan setil alkol, lokal deri reaksiyonlarına (rneđin, kontakt dermatite) neden olabilir.

FUCİDOX'un ieriđinde bulunan susuz lanolin, lokal deri reaksiyonlarına (rneđin, kontakt dermatite) neden olabilir.

Diđer ilalarla birlikte kullanımı

FUCİDOX iin bildirilmiř bir ila etkileřimi yoktur.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUCİDOX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:

FUCİDOX lezyonlara gnde 2-3 kez ve lezyonlar zerine, iyileřme sađlanana kadar uygulanır.

Uygulamadan sonra lezyonun zeri kapatılabilir veya aık kalabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

FUCİDOX cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

Eğer FUCİDOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDOX kullandıysanız

FUCİDOX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCİDOX'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUCİDOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUCİDOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

- Cilt döküntüleri
- Deri tahrişi
- Ciltte kaşıntı, yanma ve batma hissi
- Ciltte kızarıklık
- Deride kuruma

Bilinmiyor:

- Alerjik reaksiyon
- Kontakt dermatit (belirli maddelerle temasın neden olduğu deri dış tabakalarının iltihaplanması)
- Egzama (farklı nedenlerle ortaya çıkabilen deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen yaygın bir deri hastalığı)
- Ürtiker (kurdeşen)
- Göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan 'İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FUCİDOX'un Saklanması

FUCİDOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, direkt gün ışığı ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİDOX'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No: 2
06935, Sincan/ANKARA

Üretim Yeri:

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No: 2
06935, Sincan/ANKARA

Bu kullanma talimatı/.... tarihinde onaylanmıştır.