

## KULLANMA TALİMATI

BİMAGAN 0.3 mg/ml Göz Damlası, Çözelti

**Steril**

**Göze damlatılır.**

- **Etkin maddeler:** 1 ml çözelti etkin madde olarak 0,3 mg bimatoprost içerir.
- **Yardımcı maddeler:**  
Benzalkonyum klorür, sodyum klorür, sodyum fosfat dibazik heptahidrat, sitrik asit monohidrat, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit (pH ayarı için), saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***BİMAGAN nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***BİMAGAN 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***BİMAGAN nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***BİMAGAN 'un saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. BİMAGAN nedir ve ne için kullanılır?**

BİMAGAN, 5 ml'lik plastik şişede kullanıma sunulan bir göz damlasıdır.

BİMAGAN etkin madde olarak bimatoprost içerir, bimatoprost prostamidler adı verilen ilaç

grubunun bir üyesidir.

BİMAGAN, gözdeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılır. Tek başına ya da beta blokerler adı verilen ve gözdeki yüksek basıncı düşürmek için kullanılan başka ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

Gözünüz, gözün iç tarafını besleyen berrak, su gibi bir sıvı içermektedir. Bu sıvı sürekli olarak gözün dışına boşaltılmakta ve bunun yerini yeni yapılan sıvı almaktadır. Sıvı dışarıya yeterince hızlı olarak boşaltılmaz ise, gözün iç tarafındaki basınç artar. BİMAGAN, boşaltılan sıvı miktarını artırarak etki gösterir. Bu durum göz içindeki basıncı azaltır. Eğer yüksek basınç azaltılamazsa, glokom adı verilen bir hastalığa yol açabilir ve bu durum görmenizi bozabilir.

## **2. BİMAGAN 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BİMAGAN 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Bimatoprost veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassas iseniz) varsa
- Geçmişte damlanın içindeki koruyucu madde benzalkonyum klorürün yan etkisi nedeniyle göz damlası uygulamasını bıraktıysanız

### **BİMAGAN 'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Solunum problemleriniz
- Karaciğer veya böbrek problemleriniz var ise
- Daha önceden katarakt ameliyatı geçirdiyseniz
- Kontakt lens kullanıyorsanız (bkz. "BİMAGAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler")
- Geçmişte tansiyonunuz veya kalp atışlarınız düşük idiye ya da hala düşükse
- Gözünüzde virüse bağlı bir enfeksiyon ya da iltihaplanma olduysa
- Göz kuruluşunuz varsa
- Korneanızda (gözün ön tarafında bulunan şeffaf yapı) sorunlar varsa veya geçmişte olduysa

BİMAGAN, kirpiklerinizin uzamasına ve renginin koyulaşmasına sebep olabilir. Ayrıca göz kapağınızın etrafındaki derinin de koyulaşmasına sebep olabilir. Zamanla göz bebeğinizin etrafındaki renkli kısmın (iris) rengi de koyulaşabilir. Bu değişiklikler kalıcı olabilir.

Değişiklik, sadece tek göze tedavi uygulanıyorsa daha dikkat çekici olabilir.

BİMAGAN'ın içinde koruyucu madde olarak bulunan benzalkonyum klorür, gözde tahrişe ve kontakt lenslerin renginin bozulmasına yol açabilir. BİMAGAN kullanılmadan önce kontakt lenslerin çıkartılması ve ilacın verilmesinden 15 dakika sonra tekrar takılması gerekir.

BİMAGAN, 18 yaşın altındaki çocuklarda araştırılmadığından 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmaz.

Çok dozlu göz damlası kullanımıyla ilişkili olarak bakteriyel keratit bildirimleri bulunmaktadır. Bu ürünler, çoğunlukla aynı zamanda başka bir göz hastalığı olan hastalar tarafından kazara kontamine edilmiştir. Gözün epitel yüzeyinde bozulma olan hastalar bakteriyel keratit gelişimi açısından daha büyük risk altındadır.

BİMAGAN'ın cilt yüzeyiyle tekrarlanan şekilde temas ettiği alanlarda tüylenme potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle BİMAGAN'ın tavsiye edildiği şekilde uygulanması ve yanak veya diğer cilt alanlarına akmasını önlemek önemlidir.

BİMAGAN tedavisini takiben yaygın olmayan sıklıkta ( $\geq 1/1.000$  ila  $\leq 1/100$ ) kistoid maküler ödem bildirilmiştir. Bu nedenle maküler ödem riski olduğu bilinen hastalarda (örn: afakik hastalar, yırtık posterior lens kapsülü olan psödo fakik hastalar) BİMAGAN dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **BİMAGAN 'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

BİMAGAN'ın yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

BİMAGAN, doktorunuz tarafından önerilmediği sürece hamilelik esnasında kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

BİMAGAN anne sütüne geçebilir, bu nedenle BİMAGAN kullanırken emzirmemeniz gerekir.

### **Araç ve makine kullanımı**

BİMAGAN kullandıktan kısa bir süre sonra geçici bir görme bulanıklığı söz konusu olabilir.

Görüşünüz tekrar netleşene kadar araç veya makine kullanmamanız gerekir.

### **BİMAGAN 'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Koruyucu olarak benzalkonyum klorür içerdiğinden, gözde tahrişe neden olabilir. Gözlerinizde lens varken kullanmayınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Birden fazla göz damlası kullanıyorsanız, önce BİMAGAN'ı damlatınız ve diğer damlayı en az 5 dakika ara ile uygulayınız.

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BİMAGAN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

BİMAGAN, yalnızca göze uygulanır. BİMAGAN'ı her zaman doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Normal doz, hasta göze akşamları günde bir kez tek damladır.

Günde bir kereden fazla kullanmayınız, tedavinin etkisi azalabilir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Şişenin kapağındaki kurcalamaya karşı güvenlik bandı bozulmuş ise ürünü kullanmayınız.



1. Ellerinizi yıkayın. Başınızı arkaya doğru eğin ve tavana bakın.
2. Alt göz kapağınızı cep oluşturana kadar yavaş yavaş aşağı doğru çekin.
3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi gereken göze bir damla düşene kadar şişeyi sıkın.
4. Alt göz kapağınızı bırakın ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapayın.

Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyin. ilacın yanağınıza akan kısmını silin.

İltihaplanmalann önlenmesine yardımcı olmak için, şişenin ucunun gözünüze ya da herhangi bir başka yüzeye temas etmesine izin vermeyiniz. Şişeyi kullandıktan hemen sonra kapağını kapatınız.

Birden fazla göz damlası kullanıyorsanız önce BİMAGAN 'ı damlatınız ve diğer damlayı en az 5 dakika ara ile uygulayınız.

### **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanımı**

18 yaşın altındakilerde BİMAGAN kullanılmamalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanımı**

Yaşlı hastalarda herhangi bir dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

### **Özel kullanım durumları**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan, bu rahatsızlıklar sizde var ise doktorunuza söyleyiniz ve BİMAGAN 'ı dikkatli kullanınız.

*Eğer BİMAGAN 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BİMAGAN kullandıysanız:**

*BİMAGAN 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Kullanmanız gerekenden daha fazla BİMAGAN kullandıysanız, bu durumun size herhangi ciddi bir zarar vermesi olası değildir. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında damlatınız.

#### **BİMAGAN 'ı kullanmayı unutursanız:**

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BİMAGAN kullanmayı unutursanız, hatırladığımız an tek bir damla damlatınız ve daha sonra normal damlatma seyrinize dönünüz.

BİMAGAN, tam etki göstermesi için her gün düzenli kullanılmalıdır. BİMAGAN'ı bıraktığımız taktirde göz içi basıncınız artabilir, o nedenle BİMAGAN'ı kesmeden önce

doktorunuzla görüşünüz.

**BİMAGAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

BİMAGAN sonlandırıldığında herhangi bir etki bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlarda olduğu gibi BİMAGAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, BİMAGAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİMAGAN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Çok yaygın:	10 hastada 1'den fazla kişiyi etkileyen
Yaygın:	100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen
Yaygın olmayan:	1,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen
Seyrek:	10,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen
Çok seyrek:	10,000 hastada 1'den az kişiyi etkileyen

**Çok yaygın yan etkiler:**

Gözdeki etkiler:

- Kirpiklerde uzama (%45'e kadar)
- Hafif kızarıklık (%44'e kadar)
- Kaşıntı (%14'e kadar)

**Yaygın yan etkiler:**

Gözdeki etkiler:

- Gözde alerjik reaksiyon

- Göz yorgunluğu
- Işığa karşı hassasiyet
- Gözün çevresindeki deride renk koyulaşması
- Kirpiklerin renginde koyulaşma
- Ağrı
- Gözde yabancı cisim hissi
- Gözlerde yapışkanlık
- İris renginde koyulaşma
- Net görmeye zorluk
- Tahriş
- Yanma
- Göz kapağında iltihap, kızarıklık ve kaşıntı
- Göz yaşarması
- Kuruluk
- Görüşün kötüleşmesi
- Görüşün bulanıklaşması
- Göz yüzeyini kaplayan görmeye yardımcı tabakada şişkinlik
- Göz yüzeyinde iltihaplı ya da iltihapsiz küçük çatlaklar

Vücuttaki etkiler:

- Baş ağrısı
- Karaciğerinize ait kan testlerinin sonuçlarında artış
- Kan basıncında artış

**Yaygın olmayan yan etkiler:**

Gözdeki etkiler:

- Kistoid makula ödemi (gözün içindeki retinanın görmeye yol açan şişmesi)
- Göz içinde iltihap
- Retinada kanama
- Göz kapağının şişmesi
- Göz kapağının seğirmesi
- Göz kapağının küçülmesi, göz yüzeyinden uzaklaşması
- Gözün çevresindeki deride kızarıklık

Vücuttaki etkiler:

- Bulantı

- Bař dnmesi
- Gçszlk
- Gzn etrafında kıllanma

### **Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:**

#### Gzdeki etkiler:

- Gz kresinin gz bořluęunda daha derindeymiř gibi durması

#### Vcttaki etkiler:

- Astım
- Astımın ktleřmesi
- Kronik obstruktif akcięer hastalığı (KOA) isimli akcięer hastalığına ktleřmesi
- Nefes darlığı
- Alerjik reaksiyon belirtileri (řiřme, gzde kızarıklık ve ciltte isilik)

Fosfat ieren dięer gz damlaları ile grlen yan etkiler:

Bazı hastalarda ok seyrek olarak, tedavi sırasındaki kalsiyum birikmesi nedeniyle gzn n kısmındaki řeffaf tabakada (kornea) bulanık alanlar geliřmiřtir.

*Eęer bu kullanma talimatında bahsi geemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıęınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan ‘‘İla Yan Etki Bildirimi’’ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduęunuz ilacın gvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı saęlamıř olacaksınız.

### **5. BİMAGAN ’in saklanması**

BİMAGAN ’ı ocukların gremeyeceęi ve eriřemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

řiřeyi ilk aıldıęından 4 hafta sonra, iinde birka damla kalmıř olsa dahi atmalısınız. Bu iltihaplanmayı nleyecektir. řiřeyi atıęınız tarihi hatırlamanıza yardımcı olması iin řiřenin ilk aıldıęı tarihi kutunun zerindeki boř alana yazınız.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra BİMAGAN ’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları pe atmayınız! evre ve řehircilik



Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:***

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar / İstanbul

***Üretim yeri:***

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar / İstanbul

*Bu kullanma talimatı 06.06.2018 tarihinde onaylanmıştır.*