

KULLANMA TALİMATI

FENKO 62.4 mg/5 ml şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 35,5 mg Oksolamin baz'a eşdeğer, 62,4 mg Oksolamin sitrat içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserol (E422), Etil alkol, Benzoik asit (E210), Vişne esansı, Sukroz, Ponceau 4R (E124), Sitrik Asit, Deyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***FENKO nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***FENKO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***FENKO nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***FENKO'nun saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. FENKO nedir ve ne için kullanılır?

- FENKO, etken maddesi Oksolamin sitrat sayesinde solunum yolları mukozasının inflamasyonuna (iltihap, yangı) bağlı ateş, ağrı ve tahrişi ortadan kaldıran; balgamı eritici etkisi ile salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eden bir ajandır.
- FENKO, 125 ml şurup içeren bal renkli cam şişede, 5 ml'ye işaretli ölçü kabı ile birlikte sunulur.
- Kırmızı renkli, vişne kokulu, şurup görünümündedir.

- FENKO, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden öksürüğün semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılabilir.

2. FENKO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FENKO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- FENKO'nun herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,
- Hasta 6 yaşından küçükse.

FENKO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eğer mide hassasiyetiniz varsa yemekten sonra kullanınız. Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FENKO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yeterli çalışma bulunmadığından, FENKO hamilelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, FENKO emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

FENKO, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

FENKO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

- Bu tıbbi üründe hacmin % 10,14'ü kadar etanol (alkol) vardır. Her dozda 400 mg alkol vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.
- Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
- FENKO'nun içeriğindeki ponceau 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) ilaçlarla tedavi görüyorsanız FENKO'yu kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FENKO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde, 5 ml'lik 3 ölçek; 6 yaşından büyük çocuklarda ise 5 ml'lik 1-2 ölçek günde 4 kere yemekten sonra kullanılır.

Doktorunuz FENKO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır. Gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Eğer FENKO'nun etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FENKO kullandıysanız:

Aşırı doz durumunda baş dönmesi, renk solgunluğu, kusma ve heyecanlanma görülebilir.

FENKO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FENKO'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FENKO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FENKO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PEREBRON®'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ağız, yüz ve/veya boğazda şişme (anjyonörotik ödem [mukoza ve cilt altı dokularda meydana gelen ani şişme]),
- Nefes alma güçlükleri (göğüste sıkışıklık veya hırıltı),
- Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FENKO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

FENKO kullanımına baęlı ařaęıdaki yan etkiler de grlebilir:

Yaygın olmayan (1000 hastada 1'den fazla ve 100 hastada 1'den az):

- ocuklarda gz yanılısamasına sebep olabilir.

Seyrek (10.000 hastada 1'den fazla ve 1.000 hastada 1'den az):

- zellikle hassas bir yapıya sahipseniz a karnına verilince bulantı, kusma, mide yanması ve baęırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. řurubun eřit miktarda su ile karıřtırılması ve yemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle nlenebilir.

ok seyrek (10.000 hastada 1'den az):

- Aęız mukozasında geici his azalması
- Ařırı hassasiyeti olanlarda kurdeřen

Eęer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılıřırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıęınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İla Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduęunuz ilacın gvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı saęlamıř olacaksınız.

Eęer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılıřırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FENKO'nun saklanması

FENKO'yu ocukların gremeyeceęi, eriřemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıęında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalaj veya etiket zerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FENKO'yu kullanmayınız.

Son kullanma tarihi gemiř veya kullanılmayan ilaları öpe atmayınız! evre ve řehircilik Bakanlıęınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İlsan İla ve Hammaddeleri San. Tic. A.ř.

Sancaktepe/İSTANBUL

Üretim Yeri:

Atabay İla Fabrikası A.ř.

Kadıköy/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı .../.../..... tarihinde onaylanmıřtır.