

KULLANMA TALİMATI

OSVİPAC® 70 mg+1000 mg/880 IU tedavi paketi

Ağız yolu ile alınır.

• **Etkin maddeler:**

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Her bir efervesan tablet 70 mg Alendronik asit'e eşdeğer 91.4 mg Alendronat sodyum trihidrat içerir.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Her bir efervesan tablet 1000 mg Kalsiyum'a eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 IU Vitamin D₃ içerir.

• **Yardımcı maddeler:**

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Sitrik asit anhidrus, sodyum karbonat, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), PEG 6000, aspartam (E 951), limon aroması içerir.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, laktöz monohidrat, povidon K25, sodyum sakarin, sodyum siklamat, PEG 6000, malik asit, portakal aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **OSVİPAC nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OSVİPAC'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OSVİPAC nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OSVİPAC'ın saklanması.**

Başlıkları yer almaktadır.

1. OSVİPAC nedir ve ne için kullanılır?

OSVİPAC tedavi paketi Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet (strip ambalajda 4 efervesan tablet) ve Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet (plastik t p, silikajelli kapak ambalajda 24 (4x6) efervesan tablet)'ten oluřmaktadır.

Alendronik asit 70 mg efervesan tabletin ierięindeki alendronat, bifosfonatlar olarak adlandırılan hormonal olmayan bir ila grubuna aittir. Alendronat menoz sonrası, kadınlarda g r len kemik kaybını  nler ve kemięin tekrar yapılanmasına yardımcı olur. Kala kemięi ve omurga kırığı riskini azaltır. Alendronat kırıkların  nlenmesi iin erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde de yararlıdır.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/ 880 IU efervesan tablet, kemiklerin b y me ve g lenmesini saęlayan kalsiyumu ve yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini d zenlemede rol oynayan D₃ vitaminini ierir.

OSVİPAC, kadınlarda menoz sonrası (kadınlarda adetten kesilme) g r len ve kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz tedavisi ve  nlenmesinde, osteoporozlu erkeklerde kemik kırıklarının  nlenmesinde kullanılır.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz, kemiklerin erimesi ve zayıflamasıdır. Menoz sonrası kadınlarda yaygındır; ancak erkeklerde de g r lebilir. Menozda yumurtalıklar kadının saęlıklı bir iskelete sahip olmasına yardımcı olan diřilik hormonu  strojeni  retmeyi bırakırlar. Sonu olarak kemik kaybı g r l r ve kemikler zayıflar. Bir kadın menozda daha erken girerse, daha fazla osteoporoz riski oluřur.

Osteoporozun bařlangıcında genellikle belirti g r lmez. Ancak, tedavi edilmezse kemiklerde kırılma oluřabilir. Kırıklar genellikle aęrı yapsa da, omurga kemięindeki kırıklar, boy kaybına neden olana kadar fark edilemeyebilir. Kırıklar, bir Őey kaldırma gibi olaęan g nl k faaliyet sırasında ya da genellikle, normal kemięin kırılmasına neden olmayan k  k yaralanmalardan dolayı oluřabilir. Kırıklar genellikle, kala, omurga ya da bilekte g r l r ve hem aęrıya hem de  nemli Őekil bozuklukları ve sakatlıęa neden olabilir (omurganın eęrilięinden dolayı kambur duruř ve hareket kaybı gibi).

Osteoporoz nasıl tedavi edilebilir?

Osteoporoz tedavi edilebilir ve tedaviye bařlamak iin hi bir zaman ge deęildir. OSVİPAC, hem kemik kaybını  nler hem de kaybedilen kemiklerin yeniden yapılmasına yardım eder ve kala kemięi ve omurgada oluřabilecek kırık olasılıęını azaltır.

Ayrıca, doktorunuz size yařam tarzınızda ařaęıdaki deęiřiklikleri yapmanızı  nerebilir:

- Sigarayı bırakma: Sigaranın, kemik kaybı oranını ve bu nedenle kırık riskini artırdığı bilinmektedir.
- Egzersiz: Kaslar gibi kemiklerin de g l  ve saęlıklı kalması iin egzersize ihtiyaı vardır. Herhangi bir egzersiz programına bařlamadan  nce doktorunuza danıřınız.

- Dengeli beslenme: Doktorunuz size, beslenme düzeninizi deęiřtirmenizi ya da besin takviyesi almanızı tavsiye edebilir.

2. OSVİPAC'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ağız yoluyla alınan bifosfonat grubu ilaçların kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığın varlığında OSVİPAC kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız.

Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemięi kırıkları görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuran hastalar olağan dışı kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

OSVİPAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Eğer,

- Alendronata veya efervesan içerdiği diğer maddelere karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
- Daralma veya yutkunmada güçlük gibi belirli bir yemek borusu (ağızınızı mideye bağlayan boru) hastalığınız varsa,
- En az 30 dakika boyunca ayakta duramıyor veya dik oturamıyorsanız,
- Doktorunuz kanınızdaki kalsiyum değerinizin düşük olduğunu söylemişse,
- Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluęunuz varsa,

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg /880 IU efervesan tablet

Eğer,

- Kalsiyum, D vitamini veya efervesan tabletin içerdiği diğer maddelere karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
- Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa,
- D vitamini fazlalığınız (hipervitaminoz) varsa,
- Böbrek ve idrar yolu taşı oluşumu riskiniz varsa,
- Böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse (böbrek yetmezlięi),
- Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız.

OSVİPAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Eğer,

- Böbrek hastalığınız varsa,
- Yutma veya sindirim ile ilgili probleminiz varsa,
- Doktorunuz size Barrett özofagusunuz (yemek borusunun alt tarafındaki hücrelerde değişiklikler ile ilişkili bir durum) olduğunu söylerse,
- Kanınızdaki kalsiyum seviyesi düşükse,
- Zayıf diş sağlığı, diş eti çekilmesi, planlanan diş çekiminiz varsa veya düzenli diş bakımı yapmıyorsanız,
- Kanserseniz,
- Kemoterapi veya radyoterapi görüyorsanız,
- Kortikosteroid ilaçlar (prednizon veya deksametazon gibi) alıyorsanız,
- Sigara kullanıyorsanız veya kullanmışsanız (bu durum dental problem riskini arttırabilir),
- Uzun süreli kulak enfeksiyonları dahil olmak üzere kulağınızla ilgili problemler yaşıyorsanız.

OSVİPAC ile tedaviye başlamadan önce dişlerinizi kontrol ettirmeniz önerilebilir.

OSVİPAC ile tedavi sırasında iyi ağız hijyeninin devamlılığı önemlidir. Tedaviniz boyunca rutin diş kontrolünüzü yaptırmalısınız ve diş kaybı, ağrı veya şişme gibi ağız veya dişlerinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız, doktorunuz veya diş hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.

Alendronik asit içeren efervesan tableti bir bardak su içerisinde eriterek almadıysanız veya aldıktan sonra 30 dakika geçmeden uzandıysanız yemek borunuzda (ağzınızı mideye bağlayan boru) iritasyon, iltihaplanma veya ülserasyon ile birlikte göğüs ağrısı, mide yanması, veya yutkunmada güçlük veya ağrı görülebilir. Bu belirtiler görülmeye başladıktan sonra hasta alendronat almaya devam ederse belirtiler daha da kötüleşebilir.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Eğer,

- Böbrek işlevleriniz bozursa,
- Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa,
- İdrarda kalsiyum seviyeniz yüksekse (hiperkalsüri),
- Kanda fosfat seviyeniz düşükse (hipofosfatemi),
- Başlıca belirtileri kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OSVİPAC'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Yiyecekler veya içecekler (maden suyu dahil) ile birlikte alınması alendronatın etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı "Bölüm 3. OSVİPAC nasıl kullanılır?" başlığı altında verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte Kalsiyum/Vitamin D₃ etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız OSVİPAC almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Kalsiyum/Vitamin D₃ içeren efervesan tablet yüksek dozda D vitamini içerir. Hamilelik döneminde yüksek doz D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralma (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) sebep olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Emziriyorsanız OSVİPAC almayınız

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg /880 IU efervesan tablet

D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer; ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Araç ve makine kullanma becerisini etkileyebilen, alendronat ile ilgili bildirilen yan etkiler (bulanık görme, baş dönmesi ve şiddetli kemik, kas veya eklem ağrılarını içeren) mevcuttur. OSVİPAC'a karşı bireysel cevaplar farklı olabilir (Bakınız "Olası yan etkiler nelerdir").

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

OSVİPAC'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Her bir efervesan tablet 12.41 mmol (285.43 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Her bir efervesan tablet sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her bir efervesan tablet aspartamdan dolayı fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan kişiler için zararlı olabilir.

Kalsiyum /Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Her bir efervesan tablet 3.94 mmol (90.66 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Her bir efervesan tablet laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

- Aynı anda alınırsa, kalsiyum takviyeleri, antasidler (mide asit salgısını dengeleyen ilaçlar) ve bazı ağızdan alınan ilaçlar alendronatin emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, “3. OSVİPAC nasıl kullanılır?” başlığında verilen talimatlara uymanız önemlidir.
- NSAİİ’ler (asetilsalisilik asit veya ibuprofen gibi) olarak adlandırılan, romatizma veya uzun süreli ağrıların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar sindirim sorunlarına neden olabilir. Dolayısıyla, bu ilaçlar alendronik asit ile aynı zamanda kullanıldığında dikkatli kullanılmalıdır.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg /880 IU efervesan tablet

- Diğer D vitaminleri, Kalsiyum/Vitamin D₃’ün etkisini artırır.
- Belirli idrar söktürücü ilaçlar (tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. Kalsiyum/Vitamin D₃’ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (barbitüratlar) ile birlikte kullanılması, vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
- İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler) ile birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
- Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozitleri) ile birlikte Kalsiyum/Vitamin D₃’ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
- Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (bifosfonatların ve

sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. Kalsiyum/Vitamin D₃ ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.

- Kalsiyum/Vitamin D₃ ile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. Kalsiyum/Vitamin ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
- Kalsiyum tuzları T₄ emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin (tiroid hormonu) kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
- Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarını doyurarak verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) etkinliğini azaltabilir.
- Atenolol gibi beta blokörlerle (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması, beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
- Kalsiyum/Vitamin D₃ çinkonun emilimini azaltabilir.
- Levotroksin içeren ilaçların kalsiyum karbonat ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OSVİPAC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde önerilen OSVİPAC dozu, haftada bir kez bir Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet alımından sonra takip eden 6 gün boyunca günde 1 kez bir Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablettir. Bu tedavi planı tedavi sonlanana kadar her hafta tekrarlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Ağızdan kullanım içindir.

Efervesan tableti bir bardak (200 ml) suda eritiniz. Sonra bardağın tamamını bekletmeden içiniz.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Ağızdan kullanım içindir.

Size önerilen miktarda ve zaman aralığında Kalsiyum / Vitamin D₃ 1000 mg / 880 IU efervesan tableti kullanınız.

Efervesan tableti bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağın tamamını bekletmeden içiniz.

Tedavinin size yararlı olması için aşağıda anlatılan önemli talimatları uygulamalısınız:

1. Programınıza en uygun olan bir gün seçiniz. Her hafta, seçtiğiniz günde bir tane Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet alınız. İlacın hızlıca midenize ulaşması ve yemek borunuzu tahriş etme riskini önlemek için aşağıda yazan 2, 3, 4 ve 5. basamakları takip etmeniz önemlidir.

2. Seçtiğiniz gün uyandıktan sonra ve günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da diğer bir ilacınızı almadan önce, Alendronik Asit 70 mg efervesan tableti yalnızca tam dolu bir bardak su içerisinde (maden suyu değil) (200 ml'den az olmamak kaydıyla) eriterek alınız.
 - Maden suyu ile birlikte almayınız
 - Kahve ya da çay ile birlikte almayınız.
 - Meyve suyu veya süt ile birlikte almayınız.Efervesan tableti çiğnemeyiniz ya da emmeyiniz.
3. Alendronik Asit 70 mg efervesan tableti aldıktan sonra yatmayınız. En az 30 dakika tamamen dik durumda kalınız (oturma, ayakta durma ya da yürüme gibi). Günün ilk yiyeceğini yiyene kadar yatmayınız.
4. Alendronik Asit 70 mg efervesan tableti gece yatmadan ya da sabah kalkmadan önce almayınız.
5. Yutma sırasında zorluk ya da ağrı hissederseniz, göğsünüzde ağrı olursa veya yeni meydana gelen ya da kötüleşen mide yanması yaşarsanız, Alendronik Asit 70 mg Efervesan Tablet'i almayı bırakınız ve doktorunuzla görüşünüz
6. Alendronik Asit 70 mg efervesan tableti aldıktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da o gün alacağınız başka bir ilacı almadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet yalnızca, mideniz boş olduğu zaman etkilidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

OSVİPAC çocuklara ve ergenlik çağındakilere verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablet

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer OSVİPAC'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OSVİPAC kullandıysanız:

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Eğer yanlılıkla bir seferde birden fazla tablet aldıysanız, tam dolu bir bardak süt içiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kusmaya çalışmayınız ve yatmayınız.

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kalsiyum / Vitamin D₃ 1000 mg / 880 IU efervesan tablet

Kaza ile gereğinden fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz veya en yakın acil servise başvurunuz.

Kalsiyum / Vitamin D₃ 1000 mg / 880 IU efervesan tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OSVİPAC'ı kullanmayı unutursanız:

Alendronik Asit 70 mg efervesan tablet

Hatırladıktan sonraki sabah yalnızca bir tane efervesan tablet alınız. Aynı gün iki tablet almayınız. Kendi programınızdaki gibi haftada bir kez seçtiğiniz gün bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg / 880 IU efervesan tablet

Efervesan tableti almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OSVİPAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzun size reçete ettiği süre boyunca OSVİPAC kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Efervesan tabletleri kullanmaya devam ederseniz, OSVİPAC sadece osteoporozunuzu tedavi edebilir. Bu ilacın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OSVİPAC tedavi paketi içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Alendronik Asit 70 mg efervesan tableti kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Kurdeşen, yutkunmada ve nefes almada güçlüğü neden olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişkinlik gibi alerjik reaksiyonlar,
- Mide yanması, yutkunmada güçlük, yutkunma sırasında ağrı, göğüs ağrısı, mide yanması veya yutmada zorluk veya ağrıya neden olabilen yemek borusunda (ağzınızı mideye bağlayan boru) yara,
- Siyah veya katran benzeri dışkı.
- Azalan veya puslu görüş ve/veya uçuşan siyah benekler görme

Aşağıdakilerden biri olursa, Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/ 880 IU efervesan tableti kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Alerjik reaksiyonlar

- Boğaz, yüz, dudaklar ve ağızın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
- Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OSVIPAC tedavi paketi içerisindeki Alendronik Asit 70 mg efervesan tablete ya da Kalsiyum/Vitamin D₃ 1000 mg/880 IU efervesan tablete karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Zihin karışıklığı
- Kemik ağrısı
- Kas zafiyeti
- Uyku hali
- Kusma
- Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi
- Aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı
- Ülser

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Kabızlık
- Gaz
- Bulantı
- Karın ağrısı
- İshal

- Kaşıntı
- Cilt döküntüsü
- Ürtiker
- Baş ağrısı
- İştahsızlık
- Şişkinlik
- Ağız kuruluğu
- Geğirme
- Mide salgısında artış
- Gece idrara çıkmada artış
- Metalik tat

Bunlar OSVİPAC'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. OSVİPAC'ın saklanması

OSVİPAC'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında kuru yerde saklayınız.

Kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OSVİPAC'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OSVİPAC'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3
Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Faks: 0 212 481 61 11
e-mail: bilgi@neutec.com.tr

Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. 1. Yol No 3
Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.