

KULLANMA TALİMATI

ARTROCOL 100 mg/2 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Kas içine uygulanır.

Steril, apirojen

- **Etkin madde:** Her bir ampul etkin madde olarak 100 mg ketoprofen içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Arginin, sitrik asit monohidrat, benzil alkol, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. ARTROCOL nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. ARTROCOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.**
- 3. ARTROCOL nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. ARTROCOL'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ARTROCOL nedir ve ne için kullanılır?

ARTROCOL'ün etken maddesi ketoprofendir. Ketoprofen, ağrı kesici ve iltihap giderici (antiinflamatuvar) etkiye sahip steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundandır.

ARTROCOL 100 mg ketoprofen içerir ve her biri 2 ml berrak ve renksiz çözelti içeren 5 veya 6 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.

ARTROCOL; osteoartrit, romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması) ve ankilozan spondilit (ağrılı ve ilerleyici bir iltihabi hastalık) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (ürük asit kristallerinin eklemden birikmesi ile meydana gelen iltihabi durum), akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (adet sancısı) tedavisinde endikedir.

2. ARTROCOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ARTROCOL'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Ketopropene veya ARTROCOL'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
- Ketopropene ve aspirin ya da diğer steroid olmayan iltihap gidericiler gibi benzer ilaçlara karşı daha önce astım, burun boşluklarında iltihaplanma (rinit), ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları geçirdiyse. Daha önce böyle bir alerji öyküsü olan hastalarda, nadiren ölümlü sonlanabilen ciddi anafilaktik reaksiyonlar (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) bildirilmiştir.
- Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-bağırsak kanamasına veya delinmesine neden olduysa
- Halen aktif veya tekrarlayan mide ve on iki parmak barsağı kanamanız varsa
- Mide-bağırsak kanamanız ya da ülseriniz, beyin kanamanız veya vücudunuzun başka bir yerinde kanamanız varsa
- Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa
- Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa veya herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız (ARTROCOL kas içine uygulandığı için kanama riski)
- Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa,
- Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız.

- Kalp damarlarının deęiřtirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki aęrı sırasında
- Benzil alkol içermesi nedeniyle, prematürelde veya yenidoęanlarda kullanılmaz.

ARTROCOL, sadece eriřkinlerin kullanması içindir, 15 yař altındaki çocuklarda kullanılmaz.

ARTROCOL’u ařaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ARTROCOL TIBBİ GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR.

Dięer aęrı, ateř ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduęu gibi ARTROCOL de, kalp krizi veya inme geçirme riskini artırabilir. Kullanılan doz yüksekse ve kullanım süresi uzunsa risk artar. Kalp hastalığınız varsa, inme geçirdiyseniz veya bu tür bir hastalıkla ilgili risk faktörleriniz olduęunu düşünüyorsanız (yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz (řeker hastalığınız) varsa, kolesterol düzeyiniz yüksekse veya sigara kullanıyorsanız, karacięer ve böbrek probleminiz varsa, diüretik (idrar söktürücü ilaç) kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Verilen dozu veya tedavi süresini ařmayınız.

Doktorunuzun tedavinizde bir düzenleme yapması gerekebileceęinden, ařaęıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

Eęer,

- Astım ve uzun süreden beri devam eden burun bořluęunda iltihaplanma (kronik rinit), sinüslerde iltihaplanma (kronik sinüzit) ve/veya burun polipi gibi rahatsızlıklarınız varsa (aspirin ve dięer steroid olmayan iltihap gidericilere karřı alerji gelişme riskiniz daha yüksektir. ARTROCOL kullanımını sizde astım krizine ve bronřlarda daralmaya neden olabilir)
- Geçirilmiş veya mevcut kalp hastalığınız (hipertansiyon ve/veya kalp yetmezlięi), karacięer veya böbrek hastalığınız veya vücudunuzda sıvı tutulması (ödem) varsa
- Diyabet (řeker hastalığı) veya yüksek kolesterol sorunu varsa, sigara kullanıyorsanız
- Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagölan, heparin) ilaç, aspirin dahil bařka bir anti-inflamatuvar (yangı, iltihap giderici) ilaç, lityum (ruhsal bozukluklarda kullanılır),

metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır), tiklodipin (kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçlar kullanılıyorsa (doktorunuz aksini önermedikçe),

- Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarında iltihabi hastalıklar varsa,
- Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa
- İltihaplı barsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa
- Daha önce mide barsak hastalığı (mide veya on iki parmak barsağı ülseri) geçirdiyse
- Mide barsak ülseri veya kanaması riskini artırabilecek, örneğin alerji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler), depresyon ilaçları (serotonin geri alım inhibitörleri), aspirin gibi pıhtı oluşumunu önleyen ilaçlar veya varfarin gibi antikoagülanlar (pıhtı önleyici ilaç) gibi ilaçlar kullanıyorsanız
- Güneşe veya UV ışınlarına (solaryum) maruz kalma cilt reaksiyonu hikayesi
- 65 yaş üzerindeyseniz.

Tedavi sırasında aşağıdakilerden biri olursa, tedaviyi durdurup doktorunuzu bilgilendiriniz:

- Enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkması veya belirtilerde kötüleşme (diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar gibi ARTROCOL de, altta yatan bir enfeksiyonun belirtilerini (ateş gibi) maskeleyebilir)
- Bu ilaca karşı alerjiniz olduğunu gösteren astım krizi, ürtiker, yüzde ve boyunda ani şişme gibi belirtiler (derhal doktorunuza veya acil servise başvurunuz)
- Mide barsak kanaması (ağızdan kan gelmesi, dışkıda kan bulunması veya dışkının siyah renkte olması) (derhal doktorunuza veya acil servise başvurunuz)
- Görme bozukluğu (bulanık görme)

Eğer kadınsanız, ARTROCOL doğurganlığınızı azaltabilir. Gebe kalmaya çalışıyorsanız, gebe kalmakta güçlük çekiyorsanız veya kısırlık tetkikleri yaptırıyorsanız, ARTROCOL'ü kullanmayınız.

Yaşlı hastalar ve zayıf hastalar, başta mide bağırsak kanaması, ülser ve delinme olmak üzere yan etkilere daha hassastırlar. Yaşlı veya zayıfsanız, doktorunuzun karaciğer ve kalp

fonksiyonlarınızı yakından izlenmesi gerekebilir. Bu durumda doktorunuz size daha düşük bir doz uygulamaya karar verebilir.

ARTROCOL, steroid olmayan iltihap giderici bir ilaç olan ketoprofen içerir.

ARTROCOL ile birlikte başka bir steroid olmayan iltihap giderici ilaç ve/veya aspirin kullanmayınız.

Kullandığınız diğer ilaçların kullanma talimatlarını dikkatlice inceleyerek, bunların başka bir steroid olmayan iltihap giderici ve/veya aspirin içermediğinden emin olunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARTROCOL'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

ARTROCOL yiyecek ve içeceklerden bağımsız olarak, kas içine derin enjeksiyon şeklinde kullanılır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Hamileliğin ilk üç ayında doktorunuz gerekirse size ARTROCOL reçete edebilir.

Hamileliğin 3.-6. ayları arasında ARTROCOL ancak doktorun tavsiyesi üzerine ve kısa süreli olarak kullanılabilir. Bu dönemde ARTROCOL'ü kesinlikle uzun süreli kullanmayınız.

Gebeliğin 6. ayından itibaren ARTROCOL'ü kesinlikle kullanmayınız çünkü ilaç bebeğinizin kalbine, akciğerine ve böbreğine zarar verebilir ve bu zarar tek bir kullanımda bile ortaya çıkabilir. Gebeliğin 6. ayından sonra ARTROCOL'ü kullandıysanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Böylece doktorunuz gerekli takibi yapabilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARTROCOL anne sütüne geçer. Bebeğinizi emzirirken ARTROCOL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ARTROCOL baş dönmesine, uyku haline, nöbetlere veya görme bozukluklarına neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

ARTROCOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ARTROCOL içeriğinde koruyucu madde olarak 2 ml'de 40 mg benzil alkol içermektedir. Premature bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bu madde bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

ARTROCOL yeterli miktarda sodyum içermektedir. Ancak bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ARTROCOL'un işlevini etkileyebilir veya ARTROCOL bazı ilaçların işlevini etkileyebilir:

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız –reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere- lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

- İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)
- Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar)
- Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar
- Digoksin - kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç
- Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar: heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi

- Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz
- Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler): siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin
- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi
- İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon veya prednisolon
- Siklosporin - organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç
- Mifepriston - gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç
- Mifepriston kullanımı takip eden 8 – 12 gün içerisinde ARTROCOL kullanmayınız.
- Lityum - bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç
- Metotreksat - kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç
- Pentoksifilin - Beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç
- Takrolimus - Organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç
- Probenesid - Gut hastalığı için kullanılan ilaç
- Zidovudin - HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ARTROCOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ARTROCOL'ün dozu kullanım nedenine göre günde 1-2 ampul arasında değişir. Günlük doz 2-3 enjeksiyonda uygulanmalıdır.

Tedavi süresi 2-3 gündür. Daha sonra tedaviye ağızdan veya makattan devam edilir.

Mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- ARTROCOL, sadece kas içine derin enjeksiyon yolu ile kullanılır.

Steril kořullara azami dikkat gösterilerek, kalçanın üst dış kadranına derin ve yavaş intramüsküler enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır. Enjeksiyon tekrarlandığında, uygulanan taraf her enjeksiyonda deęiřtirilmelidir. İęnenin ucunun kan damarı içine girmedięinden emin olmak için, enjeksiyon öncesinde aspirasyon yapılmalıdır.

Enjeksiyon sırasında řiddetli ağrı olması halinde, enjeksiyon hemen durdurulmalıdır.

Kalça protezi olanlarda, enjeksiyon karşı tarafa uygulanmalıdır.

Deęişik yař grupları

Çocuklarda kullanımı:

Güvenlilik ve etkililik verilerinin bulunmaması nedeniyle 15 yařın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yařlılarda kullanımı:

Yařlılarda tedaviye mümkün olan en düşük doz ile başlanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karacięer yetmezlięi:

Böbrek ve karacięer yetmezlięiniz varsa doktorunuz ilacın başlangıç dozunu düşürecek ve sizi yakından izleyecektir.

Ciddi karacięer ve böbrek yetmezlięinde kullanılmamalıdır.

Eęer ARTROCOL'un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduęuna dair biz izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTROCOL kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTROCOL kullandıysanız derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın saęlık merkezine başvurunuz. Hastaneye başvururken ilacınızın kutusunu yanınızda bulundurunuz. Bu sayede doktorunuz da hangi ilacı aldıęınızı görebilecektir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ARTROCOL kullandıęımızda ařaęıdaki belirtileri görebilirsiniz:

- Sersemlik hissi
- Mide ağrısı
- Hasta hissetme
- Kan basıncınızın düşmesi nedeniyle bayılma
- Nefes almada zorlanma
- Güçlkle ve gürültülü bir şekilde solunak
- Göğüste daralma hissi, sıkışma
- Dışkıda kan

ARTROCOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacıyla konuşunuz.

ARTROCOL'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ARTROCOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, ARTROCOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde bazı yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ARTROCOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes darlığı, hırıltılı solunak
- Kan basıncında (tansiyonda) aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı
- Yüz, dil, boğazda şişme (anjioödem)
- Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri
- Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygın kızamık cilt üzerinde, çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla

dolu kabartılar ve yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, gelişen bir hastalık)

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)
- Midenizde açlıkla birlikte hissedilen yanma hissi ve ağrı. Bu belirtiler midenizdeki ülserden veya guttan kaynaklanıyor olabilir.
- İdrarda kan, idrar miktarında değişiklik veya özellikle bacak, bilek veya ayaklarda şişlik. Bu belirtiler ciddi bir böbrek sorunundan kaynaklanıyor olabilir.
- Kalp ağrısı ve ani ve şiddetli baş ağrısı. ARTROCOL kalp krizi riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir.
- Kan kusma, şiddetli mide ağrıları veya koyu renkli dışkılama.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ARTROCOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek (1/1000'den az kişide görülen)

- Ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma veya ürperme (parestezi)
- Ciltte vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanama oluyorsa. Bu ciddi bir kan probleminden kaynaklanıyor olabilir.
- Ciltte solgunluk veya yorgun hissetme, baygınlık veya baş dönmesi. Bu belirtiler kansızlık ile ilişkili olabilir.
- Bulanık görme
- Gözde veya ciltte sararma (sarılık). Bu belirti karaciğerle ilgili bir problemin belirtisi olabilir.

Sıklığı bilinmeyen

- Crohn hastalığında veya kolitte kötüleşme
- Işığa veya ultraviyole lambasına karşı ciltte reaksiyon (ışığa duyarlılık)

- Saç dökülmesi
- Normalden daha fazla enfeksiyon geçirme. Bu belirti ciddi bir kan düzensizliğinden kaynaklanıyor olabilir.
- Hastalık nöbetleri
- Gözlerde ağrı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (1/10'dan az kişide görülen)

- Sindirim gücünü, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi, mide ağrısı. Bu etkiler ilacın yemekler ile birlikte kullanılmasıyla azaltılabilir.
- Hasta hissetme (bulantı) ve kusma

Yaygın olmayan (1/1000'den az kişide görülür)

- Kabızlık, ishal veya gaz
- Ciltte döküntü ve kaşıntı
- Su tutulmasına bağlı olarak kollarda ve bacaklarda şişme
- Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşuk veya uykulu hissetme, yorgunluk veya kendini iyi hissetmeme

Seyrek (1/1000'den az kişide görülür)

- Kulak çınlaması (tinnitus)
- Kilo artışı
- Ağızda iltihaplanma

Çok seyrek (1/10000'den az kişide görülür)

- Şiddetli mide ve sırt ağrısı. Bu pankreatit (pankreatosta iltihaplanma) belirtisi olabilir.

Sıklığı bilinmeyen

- Denge problemleri (vertigo), baş dönmesi
- Uykulu hissetme veya uyuyamama, ruh hali değişikliği
- Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon)

- Tat almada deęişiklik
- Burunda akma, batma, hapşırma, burunda tıkanıklık
- Ciltte kızarma
- Depresyon
- Zihin bulanıklığı
- Olmayan şeyleri duyma veya görme

Kan testleri

Kan testlerinizde karaciğer veya böbreklerinizin çalışmasıyla ilgili deęişikler görülebilir.

Bunlar ARTROCOL'un hafif yan etkileridir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenlilięi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ARTROCOL'un saklanması

ARTROCOL'u çocukların göremeyeceęi, erişemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

Ampulleri orijinal karton kutularında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARTROCOL'ü kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTROCOL'ü kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız ARTROCOL'ü şehir suyuna veya çöpe atmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar / İstanbul

Üretim Yeri: PharmaVision Sanayi ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. No:145 34010

Topkapı-İstanbul

Bu kullanma talimatı 22.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.