

KULLANMA TALİMATI

LEODEX 25 mg oral çözelti için granül içeren şaşe **Ağızdan alınır.**

Her şaşede

- **Etkin madde:** Her bir şaşe 25 mg deksketoprofen'e eşdeğer 36.90 mg deksketoprofen trometamol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sukraloz, limon aroması FA5014, Kinolin sarısı Lake 21 E104, koloidal silikon dioksit (Aerosil 200), sukroz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. LEODEX nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. LEODEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. LEODEX nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. LEODEX'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. LEODEX nedir ve niin kullanılır?

LEODEX etkin madde olarak deksketoprofen trometamol ierir. Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilalar (non-steroid antiinflamatuvar ilalar = NSAİİ) grubuna dahil aėrı kesici, iltihap giderici ve ateş dūşürücü bir ilatır.

LEODEX kas ve iskelet aėrıları, adet aėrısı, diř aėrısı, ameliyat sonrasında oluřan hafif ve orta řiddetdeki aėrıların tedavisinde kullanılır.

LEODEX 20 ve 30 adet saēe kaėıt-alūminyum polietilen folyoda ambalajlanır.

2. LEODEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEODEX'i ařaėıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eėer;

- LEODEX formülünde bulunan deksketoprofen veya diėer bileřenlerden herhangi birisine karřı ařırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,
- Astım atakları, akut alerjik nezle (burnun i yüzeyinin kısa süreli iltihabı), nazal polipler (burnun iinde alerjiden dolayı oluřan řiřlikler), kurdeřen, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boėazda řiřme) veya aspirin gibi diėer steroidal olmayan antiinflamatuvar grubu ilaları aldıktan sonra göėüste hırıltı varsa,
- Daha önceden mide ülseri (yara/kanama), sindirim bozukluėu rahatsızlıklarınız veya iltihabın (Crohn hastalıėı veya ülseratif kolit) neden olduėu barsak problemlerinizi varsa,
- Mide veya barsak kanama öykünüz varsa,
- Aėır kalp yetmezliėi, orta ve řiddetli böbrek rahatsızlıėınız veya řiddetli karaciėer fonksiyon yetmezliėiniz varsa,
- Kan pıhtılařma hastalıėınız varsa,
- Hamile iseniz veya emziriyorsanız

LEODEX'i ařaėıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eėer;

- Diėer ilalara karřı alerjiniz varsa,
- Herhangi bir alerjiniz varsa,
- Böbrek, kalp ve karaciėer hastalıėı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliėi veya sıvı tutulumundan dolayı terleme varsa,
- Kan hastalıėınız, lupus eritematозus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya mikst baė doku hastalıėınız varsa,
- Hamile kalmaya alıřıyorsanız

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse lūtfen doktorunuza danıřınız.

LEODEX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilim hızını geciktirdiėi iin yemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEODEX hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEODEX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LEODEX baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır.

LEODEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEODEX her saşede 2424.1 mg sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Önerilmeyen kombinasyonlar;

- Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer anti-inflamatuvar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullanılan ilaç)
- Varfarin, heparin ve diğer ilaçlar (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan ilaçlar)
- Lityum (bazı duyu durum hallerinin tedavisinde kullanılan ilaç)
- Metotreksat (kansere ve romatoid artrit [eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık] tedavisinde kullanılan ilaç)
- Hidantoinler ve fenitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
- Sulfametoksazol (bakteri iltihapların tedavisinde kullanılan ilaç)

Dikkat gereken kombinasyonlar;

- ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaç)
- Pentoksifilin ve okspentifilin (kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaç)
- Zidovudin (viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç)
- Klorpropamid ve glibenklamid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)

Göz önünde bulundurulması gereken kombinasyonlar;

- Kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaç)

- Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan ilaçlar)
- Probenesid (gut hastalığının tedavisinde)
- Digoksin (kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç)
- Mifepriston (hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan ilaç)
- Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Antitrombosit ajanlar (kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin kümelenmesini veya kan pıhtılarının oluşmasını azaltan ilaçlar)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LEODEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LEODEX'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz 8 saatte bir 25 mg'dır. LEODEX günde 3 saşeden fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

LEODEX ağızdan alınır.

Yemeklerden en az 30 dakika önce aç karnına alınması önerilir.

İlacın hazırlanması;

Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 mL) içme suyu eklenir.

Karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Hazırlandıktan sonra oral yoldan hemen kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

LEODEX çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş yukarısı):

Yaşlılarda önerilen başlangıç dozu günde 50 mg'dan fazla (2 saşe) olmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan fazla (2 saşe) olmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan fazla (2 saşe) olmamalıdır.

Eğer LEODEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LEODEX kullandıysanız

LEODEX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEODEX'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Almayı unuttuđunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

LEODEX ile tedavi sonlandırıldıđındaki oluřabilecek etkiler

Eđer LEODEX kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karřılařırsanız doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuza danıřarak LEODEX kullanımını sonlandırabilirsiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEODEX'in ieriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

Ařađıdakilerden biri olursa, LEODEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz:

- Ani ařırı duyarlılık tepkisi (Anafilaktik reaksiyon)
- Alerji sonucu yz ve bođazda řiřme (Anjiyonrotik dem)
- Ciltte ve gz evresinde kan oturması, řiřlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu)
- Deride ii sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (Toksik epidermal nekroliz)
- Bayılma
- arpıntı

Bunların hepsi ok ciddi yan etkilerdir. Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin LEODEX'e karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ok ciddi yan etkilerin hepsi olduka seyrek grlr.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz:

- Karaciđer fonksiyon testlerinde anormallik
- Fotosensitif reaksiyonlar (ıřıđa karřı duyarlı olma hali)
- Bbrek iltihabı
- Pankreas iltihabı
- İshal ve kusma ile birlikte grlen mide ve bađırsak enfeksiyonu
- Mide lseri, mide lseri kanaması
- Dřk tansiyon
- Yksek tansiyon
- Solunum sıklıđının azalması

- Bronşların daralması
- Nefes darlığı, nefes almada güçlük
- Kalp atımının hızlanması
- Görmede bulanıklık
- Uyuşma
- Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
- Kan pulcuğu sayısında azalma
- Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (Vertigo)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
- Yorgunluk, ağrı, güçsüzlük, titreme, keyifsizlik
- Kaşıntı
- Aşırı miktarda idrara çıkma
- Sırt ağrısı
- Adet döngüsü bozuklukları
- Prostatik bozukluklar
- Kurdeşen
- Ciltte kızarıklık
- Sivilce
- Terlemede artış
- Kabızlık
- Ağız kuruluğu
- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
- Bulantı ve/veya kusma, karın ağrısı, ishal
- Kulak çınlaması
- Hazımsızlık
- Al basma
- İştahsızlık

Bunlar LEODEX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LEODEX'in saklanması

LEODEX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. LEODEX'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEODEX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli/İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 11.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.