

## KULLANMA TALİMATI

### PREPAGEL Jel

#### Haricen uygulanır.

- **Etkin Madde:** 1 g jel; etken madde olarak 0,01 g essin; 0,05 g dietilamin salisilat içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Polietilen glikol-6-kaprilik asit (Softigen 767), Disodyum edetat, Karbomer (Karboxyvinyl Polimerisate), Lavanta yağı, Neroli yağı, Trometamol, İsopropanol (2-propanol)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PREPAGEL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PREPAGEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PREPAGEL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PREPAGEL'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. PREPAGEL nedir ve ne için kullanılır?**

PREPAGEL haricen kullanıma yönelik bir jeldir.

Şişliği giderici (antiödematöz), iltihap giderici (anti-enflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliktedir. 1 gramında etken madde olarak 0,01 g aessin; 0,05 g dietilamin salisilat ve yardımcı maddeler olarak; lavanta yağı, portakal çiçeği yağı (neroli yağı) ve isopropil alkol içerir. Bir kutu PREPAGEL, 40 gram olarak ambalajlanmıştır.

PREPAGEL travma sonucu oluşan ezik, çürük, burkulma (distorsiyon), kan toplanması (hematom) ve kırılgan kılıfı yangısında (tendosinovit [tendovaginit]) durumlarında, omurga

kemiğinin ağrılı durumlarında (servikal sendrom, sırt ağrısı, bel ağrısı [lumbago], siyatik), yüzeysel toplardamar iltihabı (tromboflebit) ve varisleşmiş damarlarda kullanılır.

## **2. PREPAGEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **PREPAGEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer PREPAGEL’in uygulanacağı bölgede açık yara varsa, deri yaralı veya ışın tedavisi görmekte olan bir vücut bölgesi ise ilaç uygulanmamalıdır. PREPAGEL’in bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

### **PREPAGEL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer PREPAGEL çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essinin etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de kan şekeri düşürücü ilaçların (sülfonilüreler) etkisinde bir artış ve metotreksat isimli ilacın toksik etkisinde artış olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **PREPAGEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

PREPAGEL haricen uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Gebelerde yapılmış kontrollü çalışmaları yoktur. Gebelik ve emzirme döneminde, tedaviye yönelik yararının olası risklerden üstün olduğuna doktor tarafından karar verildiği takdirde kullanılmalıdır. Geniş vücut yüzeylerine uzun süre uygulanmasından kaçınılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme döneminde göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

Cilt üzerine bölgesel kullanım ile ilgili olarak, araç ve makine kullanımı üzerinde bir etki bildirilmemiştir.

### **PREPAGEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PREPAGEL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bu maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastaların kullanmaması gerekir.

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer PREPAGEL çok geniş alanlara uygulanırsa, içerdiği essin'in etkisi ile pıhtılaşma önleyici ilaçların (antikoagülan) etkisinde bir artış ve dietilamin salisilatın etkisi ile de, kan şekeri düşürücü ilaçların (sülfonilüreler) etkisinde bir artış ve metotreksat isimli ilacın toksik etkisinde artış olabilir

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PREPAGEL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. PREPAGEL şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

PREPAGEL'in içindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

PREPAGEL'in içerisindeki dietilamin salisilat deriden önemli miktarda emilip zehirlenmeye yol açabileceğinden, böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır; bu hastalarda geniş yüzeylerde uzun süre kullanılmasından kaçınılmalıdır.

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PREPAGEL kullandıysanız:**

*PREPAGEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PREPAGEL'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**PREPAGEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi PREPAGEL'in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Çok nadir durumlarda alerjik deri reaksiyonu olabilir.

Bunlar PREPAGEL'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. PREPAGEL'in saklanması**

*PREPAGEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PREPAGEL'i kullanmayınız.*

***Ruhsat Sahibi:***

Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Aydınevler Mah. Sanayi Caddesi 26  
34854 Küçükyalı - İSTANBUL

***Üretim Yeri:***

Nobelfarma İlaç San. ve .Tic. A.Ş.

81100 Sancaklar/Düzce

*Bu kullanma talimatı \_\_.\_\_.\_\_\_\_ tarihinde onaylanmıştır.*