

KULLANMA TALİMATI

MEGACE 160 mg tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 160 mg megestrol asetat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, koloidal silikon dioksit, povidon K30, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MEGACE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MEGACE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MEGACE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MEGACE'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MEGACE nedir ve ne için kullanılır?

MEGACE 160 mg Tabletlerin her biri etkin madde olarak 160 mg megestrol asetat içeren, beyaz-beyazımsı renkte, oval, bikonveks, bir yüzü "160" baskılı diğer yüzü kırma çentikli, görünür bulaşma belirtisi kanıtı olmayan tabletler şeklindedir.

MEGACE 160 mg Tablet, 30 tabletlik formları ile kullanıma sunulmaktadır.

MEGACE progesteronlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

MEGACE, ilerlemiş meme kanserinin yatıştırıcı tedavisinde ve ayrıca kansere bağlı iştahsızlık ya da kilo kaybı tedavisinde kullanılır.

2. MEGACE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEGACE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Megestrol asetata veya MEGACE'nin diğer bileşenlerine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise.

Bu ilacı hamilelik teşhis testi olarak kullanmayınız.

Kan pıhtılaşması öyküsü varsa (tromboflebit gibi)

Karaciğer hastalığı varsa.

MEGACE'yi ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eęer;

- Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa
- Diyabetiniz varsa, MEGACE tablet kan řekerinizi artırabilir.

Bu uyarılar geęmiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa, sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

MEGACE'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması

MEGACE tabletinizi yiyeceklerle birlikte veya a karnına alabilirsiniz.

Az miktarda alkol ile birlikte etkileřme olmamaktadır. Ancak doktorunuz size bu konuda neride bulunabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamile iseniz; MEGACE tablet kullanmayınız, ancak doktorunuz gerekli olduęuna karar verirse MEGACE kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

MEGACE ile tedavi grdęünüz sırada bebeęinizi emzirmeyiniz.

Ara ve makine kullanımı

Doktorunuza danıřmadan herhangi bir ara ve makineyi kullanmayınız.

MEGACE'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

- 224,50 mg laktoz monohidrat ierir. Eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıęınız olduęu sylenmiřse, bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.
- MEGACE her tablette 28 mg sodyum niřasta glikolat ihtiva eder. Bu durum, kontroll sodyum diyetinde olan hastalar iin gz nnde bulundurulmalıdır.
- Megace tabletler kan řekerini ykseltebilir. Kan řekeriniz normalden yksekte doktorunuza syleyiniz.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MEGACE nasıl kullanılır?

MEGACE'i her zaman tam olarak doktorunuzun aıkladıęı řekilde kullanınız. Emin olmadıęınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Meme kanseri tedavisinde günde 160 mg (tek veya bölünmüş dozlar halinde),
- İştahsızlık veya kilo kaybı tedavisinde 400-800 mg (günde tek doz) kullanılır.
- Ekseriya iki ay kesintisiz kullanılır. Doktorunuzun önerdiği süre kadar kullanılmalıdır. Bazı hastalar yıllarca kullanır.

Uygulama yolu ve metodu:

- Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
- MEGACE tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları**Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:**

Çocuklarda MEGACE kullanımının güvenliliği ve etkililiği araştırılmamıştır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanım:

MEGACE yaşlı hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer MEGACE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEGACE kullandıysanız:

MEGACE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEGACE'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Birkaç saat içinde hatırlarsanız hemen alınız.

MEGACE ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz MEGACE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MEGACE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MEGACE'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, dil veya dudaklarda şişme,
 - Ciltte kızarıklık,
 - Nefes almada güçlük,
- Bunlar alerjik belirtilerdir.
- Pulmoner embolizm

Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Kan pıhtılaşması ölümcül olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler kan pıhtılaşması sebebiyle görülebilir.

Koordinasyon kaybı (ani)

Peltekleşmiş konuşma (ani)

Kol, kasık ve bacaklarda ağrı

Nefes darlığı

Kol ve bacaklarda zayıflık, güçsüzlük

Baş ağrısı

Bayılma

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

- Tümör alevlenmesi,
- Cushing sendromu,
- Şeker hastalığı, kan şekerinde yükselme,
- Carpal tünel sendromu, uyuşukluk,
- Kalbiniz ve damarlar ile ilgili sorunlar,
- Tansiyonunuzda yükselme,
- Nefes darlığı, nefes almada güçlük,
- Saç dökülmesi,
- Çok idrar yapma,
- Adet dışı görülen kanama,
- Ereksiyon bozukluğu.
- İştah artışı, kilo alımı,
- Sıvı retansiyonu, diz ve ayaklarda şişme
- Yüz ve boyunda kızarıklık
- Yüz ve vücutta kıllanma
- Duygu durum değişikliği,
- Halsizlik,
- Sıcak basması,
- Bulantı, kusma, ishal, şişkinlik, kabızlık,
- Döküntü,
- Kuvvetsizlik, güçten düşme,
- Ağrı, ödem.

Hastalık semptom ve belirtilerinde geçici artış olabilir. Bu yan tesirler devam ederse veya problem olursa doktorunuza tekrar gidiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MEGACE'in Saklanması

MEGACE'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Radyatöre yakın, pencere önü veya banyoda bırakmayınız.

MEGACE'i, 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MEGACE'i kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MEGACE'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: 0212 692 92 92
Faks: 0212 697 00 24

İmal Yeri: Deva Holding A.Ş.
Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sok. No: 12
34020 Topkapı/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.