

KULLANMA TALİMATI

BUSPON 10 mg kapsül

Ağız yolu ile uygulama içindir.

- **Etkin madde:** Her bir kapsülde 10.0 mg buspiron hidroklorür içermektedir.
- **Yardımcı madde(ler):** Laktoz monohidrat, nişasta, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), indigotin (E 132), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BUSPON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUSPON' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUSPON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUSPON' un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BUSPON nedir ve ne için kullanılır?

BUSPON, 25 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.

BUSPON, buspiron hidroklorür etkin maddesini içermektedir.

BUSPON anksiyolitikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup beyindeki kimyasalların düzeylerini değiştirmektedir. -

BUSPON ařađıdaki kořulları tedavisinde kullanılabilir:

- Endiře bozukluđunun kısa dđnem tedavisi
- Ruhsal dđkđntđ belirtileri ile veya bu belirtiler olmaksızın endiře semptomlarının tedavisi

2. BUSPON'u kullanmadan dđnce dikkat edilmesi gerekenler

BUSPON'u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer,

- Buspiron hidroklorit' e veya BUSPON'un iđeriđindeki yardımcı maddelerden birine karřı ařırı duyarlılıđımız (alerjiniz) varsa
- Hamileyseniz veya bebeđinizi emziriyorsanız
- Sara hastalıđımız varsa
- Őiddetli karaciđer veya bđbrek yetmezliđiniz varsa
- Porfiri hastalıđınız (Karın ađrısı ve kas kramplarına neden olan bir dđřit kalıtsal hastalık) varsa

BUSPON' u ařađıdaki durumlarda DĐKKATLĐ KULLANINIZ

Eđer,

- Geđmiřte karaciđer veya bđbrek hastalıđı yařadıysanız
- Benzodiazepin (dđrneđin nitrazepam veya temazepam) veya bařka bir yaygın sedatif veya hipnotik ila dđ kullanıyorsanız, BUSPON' u kullanmadan dđnce bu ila dđları kademeli řekilde kesmelisiniz.

Bu uyarılar, geđmiřteki herhangi bir dđnemde dahi olsa sizin i dđn ge dđerliyse lđtfen doktorunuza danıřınız.

BUSPON'un yiyecek ve i dđcek ile kullanılması

BUSPON kullanırken greyfurt suyu i dđeren dđrđnler yemeden veya i dđmeden dđnce doktorunuza danıřınız.

BUSPON kapsdđllerin alkol birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan dđnce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamileyseniz veya bebeđinizi emziriyorsanız BUSPON kullanmayınız. Herhangi bir ila almadan nce doktorunuza ve eczacınıza danıřınız:

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BUSPON emzirme dneminde gerekli olmadıka kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Kullandıđımız kapller uyusukluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Ara veya makine kullanmadan nce ilacın etkilerinden emin olunuz.

BUSPON'nin ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

Her bir BUSPON kapsl 89 mg laktoz monohidrat iermektedir. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Ařađıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, BUSPON'u kullanmadan nce doktorunuza danıřınız.

- Fenelzin ve tranilsipramin gibi ruhsal knt (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin-oksidaz inhibitrleri (MAOI)
- haloperidol ve lityum (ruhsal hastalıkların tedavisi iin)
- diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (yksek kan basıncının tedavisi iin kullanılır)
- rifampisin (tberkloz tedavisinde kullanılır)
- eritromisin, itrakonazol ve linezolid (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
- sarı kantaron, nefazodon ve L-triptofan (depresyon tedavisi iin)
- fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re-uptake inhibitorleri (SSRI)
- haloperidol ve lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili antipsikotik)
- sumatriptan gibi triptanlar (migren tedavisi iin)

- tramadol (ađrı kesici)
- baklofen (Kas gevřitici)
- lofeksidin (bađımlılık tedavisi iin)
- nabilon (mide bulantısı tedavisi iin)
- Alerji ilaları (antihistaminikler)
- nitrazepam veya temazepam gibi benzodiazepinler veya diđer sakinleřtirici ve uyku verici ilalar

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacımıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUSPON nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı iin talimatlar:**

Yařlılar da dahil olmak üzere eriřkinler

Başlangı dozu günde iki veya üç kez alınan 5 mg olup, doz her iki veya üç günde bir yükseltilebilir. Tedaviye devam ederken uygulayacağınız rutin günlük doz bölünmüş dozlar halinde alınan 15 mg ila 30 mg olup, izin verilen en yüksek günlük doz bölünmüş şekilde alınan 45 mg'dır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

BUSPON oral yolla uygulama iindir.

BUSPON kapsülleri suyla birlikte yutunuz.

- **Deđişik yař grupları:**

ocuklarda kullanımı:

İlacın ocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği bilinmediğinden bu hasta grubunda BUSPON kullanılması önerilmemektedir.

Yařlılarda kullanımı:

Yetiřkinlerde kullanıldığı gibidir.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/Karaciđer yetmezliđi:

Böbrek veya karaciđer hastalığınız varsa doktorunuz alacağınız dozu azaltabilir.

Eđer BUSPON'un etkisinin ok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSPON kullandıysanız:

Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız. Aşırı doz belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi, uyuşukluktur.

BUSPON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUSPON' u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun zamanına çok yakın değilse hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

BUSPON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Kapsülleri kullanmayı kesmeden önce doktorunuza danışınız ve doktorunuzun bu konudaki talimatlarını izleyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BUSPON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUSPON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
- Serotonin sendromunun başlıca belirtileri olan, aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, sersemlik, heyecanlanma, parestezi, uyku bozuklukları, en sık bildirilen advers etkilerdir. Diğerleri uyuşukluk, konfüzyon, nöbetler ve ağız kuruluğudur.
- Kulak çınlaması,
- Göğüs ağrısı, taşikardi, çarpıntılar,
- Burun tıkanıklığı,

- Bulantı, boğaz ağrısı,
- Terleme/nemlilik,
- Yorgunluk,

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BUSPON'un saklanması

BUSPON'u çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

15°C - 30°C'de ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUSPON'u kullanmayınız.

Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz BUSPON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1

34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal yeri:

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Gültepe Kavşağı No: 199 4. Levent/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı (gün ay ve yıl) tarihinde onaylanmıştır.