

## KULLANMA TALİMATI

### BUSPON 5 mg kapsül

#### Ağız yolu ile uygulama içindir.

- **Etkin madde:** Her bir kapsülde 5.0 mg buspiron hidroklorür içermektedir.
- **Yardımcı madde(ler):** Laktoz monohidrat, tartrazin (E102), nişasta, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), eritrosin (E127), indigotin (E 132), jelatin.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **BUSPON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUSPON' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUSPON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUSPON' un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. BUSPON nedir ve ne için kullanılır?**

BUSPON, 25 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.

BUSPON, buspiron hidroklorür etkin maddesini içermektedir.

BUSPON anksiyolitikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup beyindeki kimyasalların düzeylerini değiştirmektedir.

BUSPON ařağıdaki kořulları tedavisinde kullanılabilir:

- Endiře bozukluęunun kısa dđnem tedavisi
- Ruhsal cđkđntđ belirtileri ile veya bu belirtiler olmaksızın endiře semptomlarının tedavisi

## **2. BUSPON'u kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BUSPON'u ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eęer,

- Buspiron hidroklorür' e veya BUSPON'un ierięindeki yardımcı maddelerden birine karřı ařırı duyarlılıęınız (alerjiniz) varsa
- Hamileyseniz veya bebeęinizi emziriyorsanız
- Sara hastalıęınız varsa
- Őiddetli karacięer veya bđbrek yetmezlięiniz varsa
- Porfiri hastalıęınız (Karın aęrısı ve kas kramplarına neden olan bir eřit kalıtsal hastalık) varsa

### **BUSPON' u ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer,

- Gemiřte karacięer veya bđbrek hastalıęı yařadıysanız
- Benzodiazepin (rneęin nitrazepam veya temazepam) veya bařka bir yaygın sedatif veya hipnotik ila kullanıyorsanız, BUSPON' u kullanmadan nce bu ilaları kademeli řekilde kesmelisiniz.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dđnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **BUSPON'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

BUSPON kullanırken greyfurt suyu ieren rnler yemeden veya imeden nce doktorunuza danıřınız.

BUSPON kapsllerin alkol birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz veya bebeđinizi emziriyorsanız BUSPON kullanmayınız. Herhangi bir ila almadan nce doktorunuza ve eczacınıza danıřınız:

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

BUSPON emzirme dneminde gerekli olmadıka kullanılmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

Kullandıđımız kapller uyuřukluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Ara veya makine kullanmadan nce ilacın etkilerinden emin olunuz.

### **BUSPON'nin ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Her bir BUSPON kapsl 94 mg laktoz monohidrat iermektedir. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

BUSPON kapsl tartrazin iermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Ařađıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, BUSPON'u kullanmadan nce doktorunuza danıřınız.

- Fenelzin ve tranilsipramin gibi ruhsal knt (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin-oksidaz inhibitrleri (MAOI)
- haloperidol ve lityum (ruhsal hastalıkların tedavisi iin)
- diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (yksek kan basıncının tedavisi iin kullanılır)
- rifampisin (tberkloz tedavisinde kullanılır)
- eritromisin, itrakonazol ve linezolid (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
- sarı kantaron, nefazodon ve L-triptofan (depresyon tedavisi iin)
- fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re-uptake inhibitorleri (SSRI)
- haloperidol ve lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili antipsikotik)
- sumatriptan gibi triptanlar (migren tedavisi iin)

- tramadol (ađrı kesici)
- baklofen (Kas gevřitici)
- lofeksidin (bađımlılık tedavisi iin)
- nabilon (mide bulantısı tedavisi iin)
- Alerji ilaları (antihistaminikler)
- nitrazepam veya temazepam gibi benzodiazepinler veya diđer sakinleřtirici ve uyku verici ilalar

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BUSPON nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı iin talimatlar:**

#### **Yařlılar da dahil olmak üzere eriřkinler**

Başlangı dozu günde iki veya üç kez alınan 5 mg olup, doz her iki veya üç günde bir yükseltilebilir. Tedaviye devam ederken uygulayacađınız rutin günlük doz bölünmüş dozlar halinde alınan 15 mg ila 30 mg olup, izin verilen en yüksek günlük doz bölünmüş řekilde alınan 45 mg'dır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

BUSPON oral yolla uygulama iindir.

BUSPON kapsülleri suyla birlikte yutunuz.

- **Deđişik yař grupları:**

#### **ocuklarda kullanımı:**

İlacın ocuklardaki etkinlik ve güvenliliđi bilinmediđinden bu hasta grubunda BUSPON kullanılması önerilmemektedir.

#### **Yařlılarda kullanımı:**

Yetiřkinlerde kullanıldıđı gibidir.

- **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek/Karaciđer yetmezliđi:**

Böbrek veya karaciđer hastalığınız varsa doktorunuz alacađınız dozu azaltabilir.

*Eđer BUSPON'un etkisinin ok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSPON kullandıysanız:**

Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız. Aşırı doz belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi, uyuşukluktur.

*BUSPON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **BUSPON' u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun zamanına çok yakın değilse hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

#### **BUSPON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Kapsülleri kullanmayı kesmeden önce doktorunuza danışınız ve doktorunuzun bu konudaki talimatlarını izleyiniz.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi BUSPON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, BUSPON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
- Serotonin sendromunun başlıca belirtileri olan, aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, sersemlik, heyecanlanma, parestezi, uyku bozuklukları, en sık bildirilen advers etkilerdir. Diğerleri uyuşukluk, konfüzyon, nöbetler ve ağız kuruluğudur.
- Kulak çınlaması,
- Göğüs ağrısı, taşikardi, çarpıntılar,
- Burun tıkanıklığı,
- Bulantı, boğaz ağrısı,

- Terleme/nemlilik,
- Yorgunluk,

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. BUSPON'un saklanması**

*BUSPON'u çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25°C'nin altındaki oda sıcaklığında koruyarak saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUSPON'u kullanmayınız.

Eğer ambalajda herhangi bir hasar fark ederseniz BUSPON'u kullanmayınız.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1

34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

#### ***İmal yeri:***

Deva Holding A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32

Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

*Bu kullanma talimatı (gün ay ve yıl) tarihinde onaylanmıştır.*