

KULLANMA TALİMATI

CODEFEN 50/50 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin maddeler:** Her bir efervesan tablet 50 mg diklofenak sodyum ve 50 mg kodein fosfat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat anhidrus, adipik asit, sukraloz (E 955), dokusat sodyum, laktoz anhidrus, sodyum siklamat, povidon (PVP K25), propilen glikol, sorbitol (E 420) ve kiraz aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. CODEFEN nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. CODEFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. CODEFEN nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. CODEFEN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CODEFEN nedir ve ne için kullanılır?

CODEFEN 50 mg diklofenak sodyum ve 50 mg kodein fosfat içeren beyaz renkli, iki taraflı düz, silindirik efervesan tabletlerdir.

CODEFEN 30 efervesan tablet, strip (PE/Alüminyum/PET) içerisinde ambalajlanmıştır.

CODEFEN'in içeriğindeki diklofenak, ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan "steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ'ler)" isimli bir ilaç grubuna dahildir.

CODEFEN'in içeriğindeki diğer etken madde olan kodein, merkezi sinir sisteminde etki gösteren ağrı ve öksürük kesici bir opioid grubu ilaçtır.

CODEFEN, orta ila şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılır:

- Romatizmanın iltihaplı ve dejeneratif şekilleri: romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu), juvenil romatoid artrit (çocuklukta eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu), ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici romatizma), osteoartrit (kireçlenme) ve spondilartirit (omurga eklemlerinin iltihabı), omurganın ağrılı sendromları, eklem-dışı romatizmada
- Akut gut (damla hastalığı) ataklarında
- Travma sonrası ve ameliyattan sonraki ağrı, iltihap ve şişliklerde; örneğin diş veya ortopedik ameliyatı takiben
- Kadın hastalıklarında ağrılı ve/veya iltihap durumlarında; örneğin ağrılı adet dönemlerinde veya adneksitte (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı)
- Kulak, burun veya boğazdaki (örneğin; faringotonsillit, otit gibi) şiddetli ağrılı iltihaplı hastalıklarda yardımcı olarak kullanılır. Genel tedavi prensiplerine göre, nedene yönelik tedavilerin uygulanması esastır. Tek başına ateş tedavisinde kullanılmaz.

CODEFEN ayrıca, kuru öksürük ve ishal tedavisinde kullanılır.

2. CODEFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CODEFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Diklofenak, kodein veya CODEFEN'in bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa
- Nefes almada zorluk çekiyorsanız, veya farklı bir devamlı akciğer hastalığınız varsa
- Yakın zamanda kafa travması geçirdiğiniz veya kafa içi basıncınızda artış olduğu söylenmişse (gözlerde ağrı, görme değişiklikleri veya gözün arka kısmında baş ağrısına neden olabilir)
- İltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibuprofen) aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon geçirdiyse. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda "steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlara (NSAİİ)" şiddetli, nadiren

ölümcül, anafilaksi adı verilen dilde şişme, nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve ciltte döküntülerin eşlik edebildiği tablonun oluşabildiği bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

- Koroner arter cerrahisi (koroner arter by-pass greft ameliyatı) geçirdiyse, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde
- Mide ya da barsak ülseriniz varsa
- Mide-barsak kanalında kanamanız varsa (böyle durumlarda ortaya çıkan belirtiler arasında kanlı dışkı ya da siyah dışkı da yer alabilir)
- Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa
- Ağır kalp yetmezliğiniz varsa
- Akut veya şiddetli bronşiyal astım, hiperkarbi (kandaki karbondioksit miktarının normale göre yüksek olması)'niz varsa
- Alkol bağımlıysanız
- Barsak tıkanması riskiniz varsa
- Hamilelik döneminin son üç ayında iseniz
- Bebeğinizi emziriyorsanız

bu ilacı kullanmayınız.

CODEFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer,

- CODEFEN'i başka iltihap giderici ilaçlarla (asetilsalisilik asit/aspirin, kortikosteroidler, “kan sulandırıcılar” ya da serotonin geri alım inhibitörleri dahil) eş zamanlı olarak alıyorsanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”),
- Saman nezleniz (mevsimsel alerjik nezle) varsa,
- Daha önce mide ülseri, mide kanaması ya da siyah dışkı gibi mide-barsak sorunları geçirdiyse ya da geçmişte iltihap giderici ilaçlar aldıktan sonra mide rahatsızlığı ya da mide yanması olduysa,
- Kalın barsak iltihabı (ülseratif kolit) ya da ince barsak iltihabınız (Crohn hastalığı) varsa,
- Kalple ilgili sorunlarınız ya da hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa ya da daha önce olduysa,
- Karaciğer ya da böbrekle ilgili sorunlarınız varsa,

- Susuz kalmış olma olasılığınız varsa (örneğin hastalık, ishal, büyük bir ameliyat öncesi ya da sonrası),
- Ayaklarınız şişiyorsa,
- Kanama bozukluğunuz ya da kanla ilgili başka bozukluklarınız varsa (porfiri adında nadir bir karaciğer sorunu dahil olmak üzere),
- Böbreküstü bezlerinizde hastalık (Addison hastalığı) veya böbrek yakınındaki bir tümörün (feokromositom) neden olduğu yüksek kan basıncınız varsa,
- Şiddetli kanlı diyare dahil (psödomembranöz kolit), iltihaplı barsak hastalığınız varsa,
- Safra kesesi hastalığı ya da safra taşınız varsa,
- Yakın zamanda mide-barsak veya idrar yollarıyla ilgili bir ameliyat geçirdiyse,
- Erkekseniz ve prostat bezi büyümeniz varsa; idrar yapmada zorluk yaşıyorsanız,
- Sara (epilepsi) hastası iseniz,
- Yaşlıysanız veya zayıfsanız,
- Astım hastasıysanız veya solunum problemleriniz varsa,
- Hipotiroidiniz (tiroid bezinin az çalışması) varsa,
- Kas güçsüzlüğünüz varsa (miyastenia gravis),
- Düşük kan basıncı (hipotansiyon) veya şok,
- Alkol bağımlılığınız, ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanımınız varsa, zihinsel hastalığınız varsa

bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ayrıca;

- Kullanmanız gereken süreden daha fazla CODEFEN kullanmayınız
- Bu ilacı uzun süre kullanmanız, içeriğindeki kodeinden dolayı bağımlılığa neden olup; ilacı kestiğinizde yerinde duramama ve sinirliliğe yol açabilir.
- Baş ağrısı için uzun dönem ağrı kesici kullanımı, ağrıların daha da kötüleşmesine neden olabilir.
- CODEFEN, bir enfeksiyonun belirtilerini (örneğin baş ağrısı, yüksek ateş) hafifletebilir ve dolayısıyla enfeksiyonun saptanmasını ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Kendinizi iyi hissetmiyor ve doktora görünme ihtiyacı duyuyorsanız, CODEFEN kullandığınızı doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

CODEFEN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

CODEFEN'in yemeklerden nce ya da a karnına alınması nerilmektedir.

CODEFEN, alkol ve alkol ieren yiyecek ve ieceklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Eęer hamileyseniz ya da hamile olabileceęinizi dřunyorsanız, bunu doktorunuza syleyiniz.

Doktor tarafından nerilmedike, hamilelilięin ilk 6 ayında CODEFEN kullanmamalısınız.

CODEFEN hamilelik dneminin son c ayında kesinlikle kullanılmamalıdır, nk doęmamıř ocuęunuza zarar verebilir ya da doęum sırasında sorunlara neden olabilir.

CODEFEN hamile kalınmasını gleřtirebilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma konusunda sorunlarınız varsa, gerekli olmadıka CODEFEN'i kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Eęer bebeęinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza syleyiniz.

Bebeęinizi emziriyorsanız, CODEFEN almamalısınız; nk bu bebeęiniz iin zararlı olabilir.

Ara ve makine kullanımı

CODEFEN kullanan hastalarda nadir olarak zihin karıřıklıęı, bař dnmesi, uyuřukluk, sersemlik, hayal grme, bulanık veya ift grme, gz kararması, havale gibi yan etkiler grlebilir. Bu tr etkilerini fark ederseniz, ara ve makine kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren bařka aktivitelerde bulunmamalısınız. Bu tr bir etkiyle karıřlařtıęınız takdirde bunu mmkn olan en kısa srede doktorunuza bildiriniz.

CODEFEN'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

Her bir efervesan tablet 11.37 mmol (261.51 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontroll sodyum diyetinde olan hastalar iin gz nnde bulundurulmalıdır.

CODEFEN sorbitol ve laktoz iermektedir. Eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karıř intoleransınız olduęu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

CODEFEN'in içeriğindeki propilen glikol, dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız, bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

- Lityum, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, trisiklikler ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar. CODEFEN, MAO inhibitör tedavisi sırasında veya tedavinin bitiminden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır.
- Digoksin, meksiletin, kinidin (kalp sorunları için kullanılan ilaçlar)
- Mifepriston (düşük ilacı)
- Diüretikler (idrar miktarını arttırmak için kullanılan ilaçlar)
- ACE inhibitörleri ya da beta-blokörler (yüksek kan basıncının ve kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaç sınıfları)
- Diğer iltihap giderici ilaçlar (asetilsalisilik asit/aspirin ya da ibuprofen gibi)
- Kortikosteroidler (vücudun iltihaptan etkilenen bölgelerinde rahatlama sağlamak için kullanılan ilaçlar)
- “Kan sulandırıcılar” (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar),
- Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin hariç)
- Metotreksat (bazı kanser ya da artrit türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)
- Siklosporin (özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç) ve takrolimus (organ nakli sonrası doku reddini önlemede kullanılan bir ilaç).
- Enfeksiyona karşı kullanılan bazı ilaçlar (kinolon türevi antibakteriyel ilaçlar)
- Sülfınpirazon (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve vorikanozol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç)
- Fenitoin (havale nöbetlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)
- Metoklopramid veya domperidon (bulantı önleyici ilaçlar)
- Loperamid veya kaolin (diyare tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
- Ritonavir gibi antiviral ilaçlar
- Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar (antihistaminikler)
- Atropin (antikolinergik ilaçlar)
- Klopromazin, diazepam, temazepam gibi sinir sistemini etkileyen ilaçlar

- Anestezikler
- Opioid antagonistleri (buprenorfin, naltrekson, nalokson)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CODEFEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen dozu aşmayınız. Doktorunuzun verdiği talimatlara dikkatle uymanız ve CODEFEN'i gerektiğinden uzun süre almamanız önemlidir.

Doktorunuz tam olarak kaç tane CODEFEN alacağınızı size söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıtı bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

14 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler:

CODEFEN tedavisine verdiğiniz yanıtı göre, 6 saatte 1 CODEFEN efervesan tablet alabilirsiniz. Günde en fazla 4 CODEFEN efervesan tablet kullanabilirsiniz.

Günlük dozunuzu 2-3 seferde alınız.

Ağrılı adet dönemlerinde, belirtilerin hissedilmesi ile 1 ila 2 adet CODEFEN ile tedaviye başlanır. Gerektiğinde, günde 3 adet CODEFEN ile devam edilir. Günlük 3 adet CODEFEN, 2 ila 3 adet döngüsünde ağrıyı dindirmede ise, doktorunuz bir sonraki adet döngüsünde günlük 4 adet CODEFEN dozunı önerebilir. Günde 4 adet CODEFEN dozunı aşmayınız.

Öksürükte, tedaviye verdiğiniz yanıtı göre, günde en fazla 2 CODEFEN tablet kullanabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

- CODEFEN efervesan tablet, ağız yoluyla alınır.
- CODEFEN'in yemeklerden önce ya da aç karnına alınması önerilmektedir.
- CODEFEN bir bardak (150 mL) suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı:

CODEFEN efervesan tabletin 14 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar CODEFEN'in etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, yaşlılar doktor talimatlarına uymaya özellikle dikkat etmeli ve şikayetlerin hafifletilmesi için

gereken minimum miktarda tablet kullanılmalıdır. Yaşlı hastaların istenmeyen etkileri derhal doktorlarına bildirmeleri son derece önemlidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalar CODEFEN'i dikkatli kullanılmalı; ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar ise CODEFEN'i kullanmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar CODEFEN'i dikkatli kullanılmalı; ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar ise CODEFEN'i kullanmamalıdır.

Eğer CODEFEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla CODEFEN kullandıysanız:

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok daha fazla tablet aldıysanız, derhal doktorunuzla ya da eczacınızla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi bakım görmemiz gerekebilir. Doz aşımı belirtileri hasta hissetme, bulantı, baş dönmesi, yorgunluk, düşük kan basıncı, göz bebeğinin küçülmesi, düşük solunum hızı ve kalp atışının hızlanmasıdır.

CODEFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CODEFEN'i kullanmayı unutursanız

Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınızda vakit geçirmeden bu dozu alınız. Ancak bu süre bir sonraki dozunuzun saatine yakınsa, sadece bir sonraki tableti zamanında almanız yeterli olacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CODEFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuza danışmadan CODEFEN kullanımını sonlandırmayınız. CODEFEN'in aniden sonlandırılması yoksunluk belirtilerine (kalp atışının, solunumun veya kan basıncının artması, titreme, uyuma güçlüğü, hasta hissetme, bulantı, terleme, yerinde duramama, uyarılara karşı aşırı duyarlılık, kaygı, depresyon, iştahsızlık, diyare, gözde aşırı sulanma, burun akıntısı, hapşırma, esneme, tüylerin diken diken olması, göz bebeğinin büyümesi, güçsüzlük, ateş, kas

krampları ve su kaybı) neden olabilir; bunun önlenmesi için doz kademeli olarak azaltılarak tedavi sonlandırılmalıdır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CODEFEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CODEFEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüzün, dudakların, ağzın, dilin ya da boğazın şişmesiyle ortaya çıkan alerjik reaksiyon (buna çoğunlukla döküntü ve kaşıntı eşlik eder). Bu reaksiyon yutma gücüne, hipotansiyona (düşük kan basıncı), baygınlığa ve şoka neden olabilir. Terlemede artış, ciltte veya yüzde kızarıklık,
- Hırıltı ve göğüste sıkışma hissi (astım belirtileri),
- Ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, sersemlik, uyuşukluk, konuşamama ya da konuşma gücüne, felç (beyin ile ilgili kriz belirtileri),
- Göğüs ağrısı (kalp krizi belirtileri),
- Kafa içi basıncında artış (gözlerde ağrı, görme değişiklikleri veya gözün arka kısmında baş ağrısına neden olabilir)
- Kasılmalar (havale geçirme)
- Boynun sertleşmesi (viral menenjit belirtisi),
- Şiddetli mide ağrısı, kanlı ya da siyah dışkılama; kanlı kusma
- Olağan dışı kanama ya da morarma,
- Yüksek ateş ya da sürekli boğaz ağrısı,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kalp atışlarının hızlanması (taşikardi) veya yavaşlaması (bradikardi)
- Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
- Düşük kan basıncı (hipotansiyon) ve ayakta ölçülen düşük kan basıncı
- Solunumun yavaşlaması (yüksek dozlarda)

- Karaciğer bozukluğu (ör: fulminan hepatit, hepatik nekroz, karaciğer yetmezliği), karaciğer fonksiyonunda değişiklik (örneğin transaminaz düzeyleri),
- Derinin ya da gözlerin sararması (hepatit belirtileri)
- Safra yolunun daralması
- Akciğer iltihabı (pnömoni)
- Pankreas iltihabı
- Özofagus (besinleri boğazdan mideye taşıyan boru) ülseri
- Kan değerlerinde değişiklikler (trombositopeni, lökopeni, anemi, agranülositoz)
- Basur hastalığının alevlenmesi
- İdrarda kan, idrarda aşırı miktarda protein, idrar çıkışının ciddi şekilde azalması (böbrek bozukluklarının belirtileri), idrar yollarının daralması
- Deri renginin kırmızı ya da mor olması (damar iltihabının olası belirtileri); kabarcıklı deri döküntüleri (toksik epidermal nekroliz); dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıkların oluşması; pullanma ya da soyulmayla birlikte görülen deri iltihabı (eksfolyatif dermatit).
- Psikotik bozukluk (şizofreni, vb.),
- Tolerans (ilaç daha az etki gösterir) veya bağımlılık (ilaç aniden bırakıldığında titreme, uykusuzluk, yerinde duramama, uyarılara aşırı tepki verme, kaygı, depresyon, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, gözlerde sulanma, burun akıntısı, hapşırma, esneme, saç ve kılların dikleşmesi, göz bebeğinin büyümesi, güçsüzlük, ateş, kas krampları, su kaybı, terleme, kalp atışlarının hızlanması, solunumun hızlanması, kan basıncının artması, hasta hissetme veya bulantı gibi yoksunluk semptomları meydana gelebilir)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Kolların, ellerin, bacakların ve ayakların şişmesi (ödem),
- Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma ya da uyuşukluk,
- Kas katılığı
- Vücut sıcaklığında azalma
- Baş ağrısı, baş dönmesi,
- Kulak çınlaması, işitmede zayıflama
- Görme bozukluğu, bulanık görme, çift görme
- Göz bebeklerinin aşırı küçülmesi (miyoz)

- Işığa duyarlılık reaksiyonu,
- Ağız veya dilin iltihabı, ağızda yaralar
- Tat alma bozuklukları
- Ağız kuruluğu, iştahsızlık
- Mide ve karın ağrısı, bulantı, kusma
- Sindirim güçlüğü, ishal, kabızlık, gaz
- Ağrılı ve zor idrar yapma; normalden az sıklıkta idrara çıkma
- Sersemlik, hasta hissetme, halsizlik, yorgunluk, memnuniyetsizlik, çevreye uyumsuzluk
- Zihin karışıklığı, hafıza bozukluğu,
- Uyku hali, uykusuzluk, kabus görme,
- Depresyon,
- Kaygı, alınganlık,
- Ruh halinde değişiklikler,
- Hayal görme (halüsinasyon)
- Yerinde duramama, heyecan
- Titreme, çarpıntı,
- Kaşıntı
- Deride şişme ve su toplama (güneşe duyarlılığın artması nedeniyle).
- Deri döküntüsü, ürtiker, kızarıklık, döküntülü kızarıklık, deride küçük kanamalar
- Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)
- Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
- Saç dökülmesi
- Cinsel istekte ve cinsel güçte azalma

Bunlar CODEFEN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CODEFEN'in Saklanması

CODEFEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CODEFEN'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CODEFEN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CODEFEN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti

Adresi: Florya asfaltı

Florya İş Merkezi No: 88, Blok No:6 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 79 52

Faks: 0 212 481 79 52

e-mail: info@mentisilac.com.tr

Üretim yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 14.03.2012 tarihinde onaylanmıştır.