

## KULLANMA TALİMATI

### MEGİNGO 10/50 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir efervesan tablet 10 mg memantin hidroklorür ve 50 mg ginkgo biloba kuru ekstresi içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Sitrik asit anhidr, maltodekstrin, polietilen glikol (PEG 6000), sodyum bikarbonat, sorbitol (E420), aspartam (E951), limon aroması, beta karoten %1 CWS ve aerosil 200 içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **MEGİNGO nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MEGİNGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MEGİNGO nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MEGİNGO'nun saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. MEGİNGO nedir ve ne için kullanılır?

- MEGİNGO'nun etkin maddeleri memantin hidroklorür ve ginkgo biloba kuru ekstresidir.
- MEGİNGO, 100 (10 x 10) efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
- MEGİNGO, kahverengimsi, yuvarlak, kenarları bikonveks, ortası hafif bikonkav efervesan tabletler şeklindedir.
- MEGİNGO, demansa (bunama) karşı kullanılan ilaçlar grubundadır. MEGİNGO, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığının (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

## 2. MEGİNGO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### MEGİNGO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür, ginkgo biloba veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa bu ilacı kullanmayınız.

### MEGİNGO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

MEGİNGO'yu kullanmadan önce reçete eden doktorunuzu aşağıdaki durumlarda bilgilendiriniz.

Eğer;

- Epileptik nöbet hikayeniz varsa,
- Yakın zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altına alınamayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) şikayetiniz varsa,
- Kan pıhtılaşma sorunlarınız varsa (MEGİNGO kullanmadan önce doktorunuza bu durumu söylemelisiniz.)
- Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız,

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve MEGİNGO'nun klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, dozunuzu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç), ketamin ( anestezi olarak kullanılan ilaç), deksrometorfan (öksürüğü tedavi etmekte kullanılan ilaç) ve diğer NMDA karşıt etki gösteren ilaçlarla aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla deęiřtirdiyseñiz veya deęiřtirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiř gibi) veya renal túbúler asidoz (RTA, bóbrek fonksiyon bozukluęundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya řiddetli úriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

MEGİNGO efervesan tablet içerięindeki ginkgo bilobadan dolayı ameliyat sonrası kanama riski artabileceęinden herhangi bir cerrahi giriřim öñcesinde MEGİNGO kullanımına ara verilmelidir. MEGİNGO, çocuklar ve 18 yařından küçük adolesanlar (ergenler) için önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lútfen doktorunuza danıřınız.

### **MEGİNGO'nun yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla deęiřtirdiyseñiz veya deęiřtirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiř gibi) veya renal túbúler asidoz (RTA, bóbrek fonksiyon bozukluęundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya řiddetli úriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Hamile kadınlarda MEGİNGO kullanımı önerilmemektedir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

MEGİNGO'nun emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

### **Ara ve makine kullanımı**

Doktorunuz size ara veya makine kullanıp kullanmayacaęınızı söyleyecektir.

MEGİNGO hafif ve orta düzeyde ara ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

## **MEGİNGO'nun ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

### **Sodyum iin uyarı**

Bu tıbbi rn her dozunda 134,15 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontroll sodyum diyetinde olan hastalar iin gz nnde bulundurulmalıdır.

### **Aspartam iin uyarı**

MEGİNGO aspartam (E951) iermektedir. Fenilalanin iin bir kaynak iermektedir. Fenilketonrisi olan insanlar iin zararlı olabilir.

### **Sorbitol iin uyarı**

MEGİNGO sorbitol (E420) iermektedir. Eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı Őekerlere karŐı intoleransınız olduęu sylenmiŐe bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

## **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

zellikle aŐağıdaki ilaların etkileri MEGİNGO ile deęiŐebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

- Amantadin, ketamin, dekstrometorfan
- Dantrolen, baklofen (kas gevŐetici ilalar)
- Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
- Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
- Antikolinergikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek iin kullanılan maddeler)
- Antikonvlzanlar (nbetleri nlemek ve hafifletmek iin kullanılan maddeler)
- Barbitratlar (genel olarak uyku iin kullanılan maddeler)
- Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
- Nroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
- Oral antikoaglanlar, antiplateletler, dŐk molekl aęırlıklı heparinler, trombolitik ilalar
- Nonsteroidal antiinflamatuvar ilalar (aspirin, ibuprofen gibi)
- Nifedipin (kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ila)
- Seici serotonin geri alım inhibitrleri (rn., dapoksetin; depresyon tedavisinde kullanılan ila)
- İnslin (Őeker hastalığının tedavisinde kullanılan ila)
- Karbonik anhidraz inhibitrleri (idrar sktrc olarak kullanılan ilalar)

- Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu MEGİNGO kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. MEGİNGO nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

MEGİNGO'yu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı her gün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen doz günde bir defa bir efervesan tablettir.

Memantin için maksimum günlük alınan doz 20 mg'dır. Yan etki riskini azaltmak için, idame dozu ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg'lık artışlarla şu şekilde yapılmalıdır:

Tedaviye 5 mg'lık günlük dozla başlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg ve üçüncü hafta günde 15 mg kullanılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye 20 mg'lık önerilen idame dozu ile devam edilir.

MEGİNGO içeriğindeki ginkgo bilobanın serebral fonksiyon bozuklukların (bunama) tedavisinde önerilen günlük dozu 120 mg -240 mg'dır.

Doktorunuz hastalığınızın şiddetine göre dozunuzu belirleyecektir.

Size yararı olduğu sürece ve kabul edilemeyecek herhangi bir yan etki görülmedikçe MEGİNGO almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

MEGİNGO'yu bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağı tamamıyla içiniz. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır. MEGİNGO, aç ya da tok karnına alınabilir. MEGİNGO, her gün aynı saatte alınmalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

MEGİNGO'nun çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenilirlik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalarda önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde maksimum doz günde 2 efervesan tablettir.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek yetmezliği:**

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

**Karaciğer yetmezliği:**

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Ağır karaciğer yetmezliğiniz var ise doktorunuz size MEGİNGO kullanıp kullanmayacağınızı söyleyecektir. Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

*Eğer MEGİNGO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla MEGİNGO kullandıysanız**

MEGİNGO'dan aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

*MEGİNGO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**MEGİNGO'yu kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

MEGİNGO dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

**MEGİNGO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

MEGİNGO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, MEGİNGO'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, MEGİNGO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonları (Yüzde, dilde veya boğazda şişme, solunum güçlüğü, ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi).
- Alerjik deri reaksiyonları
- Aşırı duyarlılık
- Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
- Kalp yetmezliği
- Nefes darlığı, nefes almada güçlük

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MEGİNGO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Yüksek tansiyon
- Psikotik reaksiyon
- Venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm)
- Nöbetler
- Kasılmalar
- Halüsinasyon (Varsanı, hayal görme)
- Pankreas iltihabı
- Ameliyat sonrası kanamalarda artış

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Uyuklama hali
- Kabızlık
- Sersemlik
- Yorgunluk
- Kusma
- Yürüyüş anormalliği
- Mantar enfeksiyonu
- Hafif mide-barsak rahatsızlıkları

Bunlar MEGİNGO'nun hafif yan etkileridir.

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. MEGİNGO'nun içeriğindeki memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz*

##### **5. MEGİNGO'nun saklanması**

*MEGİNGO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MEGİNGO'yu kullanmayınız.*



***Ruhsat Sahibi:***

Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.  
General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi  
Bağımsız Bölüm No:2/13  
Zeytinburnu / İSTANBUL  
Telefon: 0 212 482 58 91  
Faks: 0 212 482 58 91  
e-mail: info@nuvomedilac.com.tr

***Üretim Yeri:***

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
1.OSB. 1. No:3 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 22.02.2012 tarihinde onaylanmıştır.*