

## KULLANMA TALİMATI

### DROGSAN POTASYUM KLORÜR % 22.5 AMPUL

10ml Ampul

Damar içine uygulanır.

*Etkin madde:* 10ml'lik ampul'de 2.250g Potasyum Klorür içerir.

*Yardımcı madde:* Enjeksiyonluk su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL'ün saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5 AMPUL nedir ve ne için kullanılır?

DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5 AMPUL, 10ml'lik 1 ampul'de 2.250g potasyum içermektedir.

DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5AMPUL'ün etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyum kayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.

Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;

- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistüllerde,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (aşırı aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama, bilinç kaybı),
- Metabolik alkaloziste (vücut sıvılarında baz fazlası olması),
- Digitalis zehirlenmelerinde,
- Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,
- Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun süreli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

## 2. DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5AMPUL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5AMPUL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
- DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5AMPUL'ü, hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ile oligüri (idrara normalden az çıkması), anüri (idrara çıkarılmaması) ya da azotemi(kanda aşırı miktarda azot bulunması)ile şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlarında,
- Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı),hiperkloremi (kandaki klorür seviyesi yüksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

## **DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Eğer magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
- Kardiyak rahatsızlığınız varsa, ilepotasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksınız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ün anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanma üzerine normal değerlerde kalındığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ü aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsanız doktorunuza danışınız.

- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları

- Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler
- İnsülin, İnsülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
- Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel olarak saatte 20mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150mEq verilebilir. Maksimum doz 3,7mEq/kg/24 saattir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL 1000mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır.

Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Maksimum doz 2-3mEq/kg/24 saattir.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

*Eğer DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL kullandıysanız:**

*DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ü kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5 AMPUL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

#### **4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, DROGSAN POTASYUM KLORÜR %22.5AMPUL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Hiperkalemi
- Felç
- Kol ve bacaklarda uyuşma
- Zihin karışıklığı
- Gri deri
- Ciltte soğukluk
- Kan basıncındaki düşme
- Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
- Kalp bloğu (kalp içi iletiminin zayıflaması)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Nefes darlığı
- Kusma
- İshal
- Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduğu damardan dışarı sızması ve lokal doku hasarı
- Karın ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- Güçsüzlük
- Enjeksiyon yerinde ağrı
- Mide gazı

Bunlar DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5 AMPUL'ün hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5 AMPUL'ün saklanması**

*DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5 AMPUL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DROGSAN POTASYUM Klorür %22.5 AMPUL'ü kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** DrogSan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah. 56. sok. No:7/3 06520  
Balgat-ANKARA

**Üretim yeri:** DrogSan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.06760 Çubuk/ANKARA