

KULLANMA TALİMATI

DROGSAN POTASYUM KLORÜR % 7.5 AMPUL

10ml Ampul

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: 10ml'lik ampul'de 0.75g Potasyum Klorür içerir.

Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ün saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5 AMPUL nedir ve ne için kullanılır?

DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5 AMPUL, 10ml'lik 1 ampul'de 0.75g potasyum içermektedir.

DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ün etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyum kayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.

Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;

- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistüllerde,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (aşırı aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama, bilinç kaybı),
- Metabolik alkaloziste (vücut sıvılarında baz fazlası olması) ,
- Digitalis zehirlenmelerinde
- Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,
- Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun süreli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

2. DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
- DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ü, hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ile oligüri (idrarın normalden az çıkması), anüri (idrarın çıkarılmaması) ya da azotemi (kanda aşırı miktarda azot bulunması) ile şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlarında,
- Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorür seviyesinin yüksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ü ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eđer magnezyum eksikliđiniz (hipomagnezemi) varsa,
- Kardiyak rahatsızlıđınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksınız,

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ün yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedike hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ün anne sütüne geip gemediđi belli deđildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanınız.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanma üzerine normal deđerlerde kaldıđı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5AMPUL'ü ařađıdaki ilalarla birlikte alıyorsanız doktorunuza danıřınız.

- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yađ emülsiyonları
- Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler

- İnsülin, İnsülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
- Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel olarak saatte 20mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150mEq verilebilir. Maksimum doz 3,7mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:

DROGSAN POTASYUM KLORÜR %7.5 AMPUL 1000mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır.

Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Maksimum doz 2-3mEq/kg/24 saattir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliđi:

Karaciğer yetmezliđi olan hastalarla yapılmıř alıřma bulunmamaktadır.

Eđer DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ün etkisinin ok gçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5 AMPUL kullandıysanız:

DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.

DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için ift doz almayınız.

DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5 AMPUL ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ün ieriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

Ařađıdakilerden biri olursa, DROGSAN POTASYUM Klorür %7.5AMPUL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blümüne bařurunuz:

- Hiperkalemi
- Fel
- Kol ve bacaklarda uyuřma
- Zihin karıřıklıđı
- Gri deri
- Ciltte sođukluk
- Kan basıncında dıřme

- Kardiyak aritmi (ritim bozukluđu)
- Kalp blođu (kalp ii iletiminin zayıflaması)

Bunların hepsi ok ciddi yan etkilerdir.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz:

- Nefes darlıđı
- Kusma
- İshal
- Kan ve lenf sıvısının iinde bulunduđu damardan dıřarı sızması ve lokal doku hasarı
- Karın ađrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi mdahale gerekebilir.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza syleyiniz:

- Gszlk
- Enjeksiyon yerinde ađrı
- Mide gazı

Bunlar DROGSAN POTASYUM Klorr %7.5AMPUL'n hafif yan etkileridir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DROGSAN POTASYUM Klorr %7.5 AMPUL'n saklanması

DROGSAN POTASYUM Klorr %7.5AMPUL' ocukların gremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın zerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DROGSAN POTASYUM Klorr %7.5AMPUL' kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Drogan İlaları San. ve Tic. A.ř. Ođuzlar Mah. 56. sok. No:7/3 06520
Balgat-ANKARA

Üretim yeri: Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.06760 Çubuk/ANKARA

Bu kullanma talimatı.....tarihinde onaylanmıştır.