

## KULLANMA TALİMATI

### MYCOSPOR® Krem

#### Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** 100 g kremde 1 g bifonazol bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Benzil alkol, setil palmitat, ketostearil alkol, oktildodekanol, polisorbata 60, sorbitan monostearat, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### Bu kullanma talimatında:

1. **MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MYCOSPOR® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MYCOSPOR®'un saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır?**

- MYCOSPOR®'un içeriğindeki etkin madde bifonazoldür. Bifonazol etkin maddesi, imidazol türevi adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar tedavisinde kullanılır.
- MYCOSPOR®, 10 gramlık tüpler içinde kullanıma sunulmuştur. 1 gram krem 0,01 gram bifonazol (etkin madde) içerir.
- MYCOSPOR®, dermatofitler, mayalar, küfler ve *Malassezia furfur* gibi mantarların neden olduğu derideki mantar enfeksiyonlarının ve *Corynebacterium minutissimum* adlı bakterinin neden olduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. MYCOSPOR®, örneğin el ve ayaklarda oluşan mantar enfeksiyonları (atlet ayağı, tinea manus), deri ve deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonları (tinea corporis, tinea inguinalis), pityriasis versicolor (*Malassezia furfur* adlı bir mantarın neden olduğu bir mantar hastalığı); yüzeysel kandidiyazis (*Candida* türünden bir mantarın neden olduğu enfeksiyon), erythrasma (*Corynebacterium minutissimum* isimli mikroorganizmanın neden olduğu bir cilt hastalığı) tedavisinde kullanılır.

## 2. MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### MYCOSPOR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- İlacın içindeki maddelere karşı alerjiniz varsa

### MYCOSPOR®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Diğer mantar ilaçlarına karşı alerji öykünüz varsa,

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

MYCOSPOR®, hamileliğin ilk 3 ayında ancak doktorunuz tarafından risk/yarar oranı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.*

### Emzirme

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

MYCOSPOR®, emziren kadınlarda ancak hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

### Araç ve makine kullanımı

MYCOSPOR®'un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi gözlenmemiştir.

### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

MYCOSPOR®'un bilinen bir etkileşimi yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## 3. MYCOSPOR® nasıl kullanılır?

### • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 defa, tercihen yatmadan önce kullanılır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Kremi ince bir tabaka şeklinde hastalıklı cilt bölgesine uygulayın ve masaj yaparak cildinize yediriniz. Genellikle az bir miktar krem el ayası kadar bir bölgenin tedavisi için yeterlidir.

- **Tedavi süresi:**

MYCOSPOR® kullanımı hastalığın bulguları ve belirtileri kaybolduktan sonra kesilmemeli ve aşağıdaki süreler boyunca devam edilmelidir.

Ayak mantarı:	3 hafta
Gövde, el ve deri kıvrımlarında mantar:	2-3 hafta
Pityriasis versicolor ve deriyi etkileyen bir enfeksiyon olan eritrazma:	2 hafta
Derinin yüzeysel mantar hastalığı (yüzeysel kandidiyazis):	2-4 hafta

Doktorunuz MYCOSPOR® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** MYCOSPOR®'un çocuklarda kullanımı ile ilgili detaylı çalışmalar mevcut değildir. MYCOSPOR® bebeklerde sadece tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:** MYCOSPOR®'un yaşlı hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

- **Özel kullanım durumları :**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer MYCOSPOR®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla MYCOSPOR® kullandıysanız:**

*Mycospor'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz*

**MYCOSPOR®'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, MYCOSPOR®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, MYCOSPOR®'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kremin temas ettiği bölgelerde alerjik reaksiyonlar
- Kremin temas ettiği bölgelerde oluşan deri hastalığı (topikal kullanımdan 2 gün sonra)
- Kızarıklık
- Deride döküntü
- Kurdeşen
- Egzema
- Kaşıntı
- Rahatsızlık hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MYCOSPOR®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

MYCOSPOR®'un böyle bir yan etkisi yoktur.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Uygulama yerinde ağrı
- Uygulama yerinde ödem
- Deride su toplama
- Ciltte soyulma
- Deride kuruma
- Deride çürüme
- Ciltte yanma hissi

Bunlar MYCOSPOR®'un hafif yan etkileridir.

MYCOSPOR®'un yan etkileri tedavinin kesilmesiyle kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

## **5. MYCOSPOR®'un saklanması**

*MYCOSPOR®'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki/kartondaki/şışedeki son kullanma tarihinden sonra MYCOSPOR®'u kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile  
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye – İSTANBUL  
Tel: 0 216 528 36 00  
Fax: 0 216 528 36 12

**Üretici:** Bayer İlaç Fabrikaları. A.Ş., İstanbul

Bu kullanma talimatı 30/01/2012 tarihinde onaylanmıştır.