

KULLANMA TALİMATI

PRENACİD göz pomadı – 5 gr

Göze uygulanır.

- **Etkin madde :**

Desonid disodyum fosfat
5 gr’da 12,5 mg Desonid disodyum fosfat içerir.

- **Yardımcı Maddeler :**

Likit petrolatum, Susuz lanolin, Beyaz petrolatum .

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. **PRENACİD nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **PRENACİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PRENACİD nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir ?**
5. **PRENACİD’in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PRENACİD nedir ve ne için kullanılır ?

- PRENACİD 5 g’lık alüminyum tüp ambalajında kullanmaya hazır steril göz pomadıdır.
- Alerjik veya alerjik olmayan gözün dış inflamasyonlarının lokal tedavisinde,
- Ameliyat ve travmadan sonra oluşabilen iltihabi durumlarda kullanılır.

2. PRENACİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PRENACİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :

- İÇERDİĞİ etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea) yaralanma varsa,
- Göz içi basıncınız yüksek ise (glokom),
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea), herpes simplex isimli virüse bağlı enfeksiyonunuz varsa,
- Gözünüzün ön bölümünde (kornea ve konjunktiva) virüse bağlı hastalıklar varsa,
- Gözünüzde mantar ve tüberküloz enfeksiyonları varsa,
- İlk evresi dahil (fluorescein testi +) ülserli keratit ile görülen konjunktivit (göz akının iltihabi yaralara sebep olan bir hastalığı),
- Kortikosteroidler (kortizon içeren ilaçlar) ile maskelenebilen herpetik (bir çeşit virus) ve pürulan blefarit (iltihaplı göz kapağı), akut pürulan oftalmia (ani başlayan göz iltihabı) ve pürulan konjunktivit (göz akının iltihabi hastalığı),
- Hordeolum (arpacık)
- Herpetik keratit (bir çeşit virusa bağlı kornea iltihabı)

PRENACİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer :

- Göz içi basıncının arttığı durumlar (glokom) varsa 15 günden fazla kullanımlarda göziçi basıncı düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Eğimli hastalarda uzun süreli kortikosteroid kullanımı göz içi basıncını artırabilir, görme bozukluklarına yol açabilir.
- Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı : 1)Katarakt oluşmasına 2) yara iyileşmesinde gecikme 3) mantar veya virüse bağlı enfeksiyon riskinde artışa yol açabilir. Gözün iltihaplı enfeksiyonlarında kortikosteroidler enfeksiyonu maskeleyebilirler.
- Bazı göz hastalıklarında uzamış kortikosteroid kullanımı gözün ön kısmında (kornea ve sklera) incelmeye yol açabilir.
- Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmadığı yada tahriş veya hassasiyet oluştuğunda PRENACİD'in kullanılmasına son verilmelidir.
- Canlı aşılarda aşılamaya yapılacaksa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PRENACİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .

Hamilelik sürecinde PRENACİD , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PRENACİD emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

PRENACİD araç ve makine kullanma yeteneğine etki etmemektedir.

PRENACİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PRENACİD'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine bağlı olumsuz bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

PRENACİD'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PRENACİD nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

PRENACİD'i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmedikçe, gece yatmadan önce, göze (alt göz kapak içlerine) az miktarda uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu :

PRENACİD,

- Yalnız oftalmik kullanım içindir.
- Göze uygulanır.
- Alüminyum tübün kapağı çevrilerek açılır ve alt göz kapağı içine az miktarda pomad uygulanır.
- Göz kapağı yaklaşık 1 dakika kapalı tutulur.
- Alüminyum tübün kapağı tekrar kapatılır.
- İlacı uygularken ambalaj ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.
- Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda Kullanımı :

Pediyatrik yaş grubunda, PRENACİD gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer PRENACİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PRENACİD kullandıysanız :

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

PRENACİD'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PRENACİD'i kullanmayı unutursanız

Eğer PRENACİD'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PRENACİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece PRENACİD kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, PRENACİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

- Gözde yanma
- Gözde batma

Bunlar PRENACİD'in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PRENACİD'in Saklanması

PRENACİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PRENACİD'i kullanmayınız.

Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PRENACID'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300

Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel : 0212- 274 51 24

Fax : 0212- 272 15 68

Üretici :

SIFI S.P.A.

'36, Via Ercole Patti 95020

Lavinaio- Aci S. Antonio

Katanya-İTALYA

Tel : 0039 095 792 21 11

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.