

## KULLANMA TALİMATI

### FLEXİMAT % 10 Jel 40 g

#### Deri üzerine uygulanır

- **Etkin madde:** Her bir g jel 100 mg etofenamat içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Karbopol 940, Transkutol, İzopropil alkol, Etil alkol, Trietanolamin, Ökalyptus yağı, Çam esansı, Deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

#### Bu Kullanma Talimatında :

1. **FLEXİMAT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FLEXİMAT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FLEXİMAT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FLEXİMAT 'ın saklanması**

#### **1. FLEXİMAT nedir ve ne için kullanılır?**

FLEXİMAT % 10 JEL, 40 g beyaz renkli jel içeren, polipropilen kapaklı alüminyum tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

FLEXİMAT % 10 JEL, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

FLEXİMAT % 10 JEL, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

- Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma

- ve zorlanmalara baęlı aęrılı durumlar.
- Diz eklemi iltihabi durumlarında, eklem çevresi yumuřak dokulardaki (bursa, tendon, baęlar ve eklem kapsülü) aęrılı durumlar.

## **2. FLEXİMAT % 10 JEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

### **FLEXİMAT % 10 JEL'i ařaęıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eęer,

- Etofenamata, FLEXİMAT % 10 JEL'in ięerdięi maddelerden herhangi birine veya dięer aęrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaęlar) karřı ařırı duyarlılıęınız (alerjiniz) varsa.
- Uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzama, aęık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.
- Dudak, burun ięi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine ufulamayınız.
- Hamilelięin geę evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.
- 18 yařından küçükseniz.

### **FLEXİMAT % 10 JEL'i ařaęıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ**

Eęer,

- Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik řiřkinlięi (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalıęınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.
- Bařka maddelere karřı, deri reaksiyonları, kařıntı veya ürtiker řeklinde alerjik Reaksiyonlar yařıyorsanız.

FLEXİMAT % 10 JEL cilalı mobilya veya plastik yüzeylede hasar ve renk deęiřiklięine yol aęabilir. Bu nedenle, FLEXİMAT % 10 JEL'i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaęınınız.

Bu uyarılar geęmiřteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin ięin geęerliyse lütfen doktorunuza danıřın.

### **FLEXİMAT % 10 JEL'in yiyecek ve ięecek ile kullanılması**

Uygulama yöntemi aęısından yiyecek ve ięeceklerle etkileřimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

FLEXİMAT % 10 JEL hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe FLEXİMAT % 10 JEL'i kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

Etofenamatin anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle FLEXİMAT % 10 JEL'i uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizde FLEXİMAT % JEL kullanmayınız.

## **FLEXİMAT % 10 JEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

FLEXİMAT % 10 JEL'in içerdiği propilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

FLEXİMAT % 10 JEL'in deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. FLEXİMAT % 10 JEL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak FLEXİMAT'ın dozunu size söyleyecektir. Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz. FLEXİMAT'ı, günde 2 kez 2.5 g'a kadar uygulayınız.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

FLEXİMAT % 10 JEL sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız! FLEXİMAT % 10 JEL'i, vücudunuzun etkilenen bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayınız ve nazikçe deriye yedirerek sürünüz.

FLEXİMAT % 10 JEL'in uygulanmasından sonra birkaç dakika deri üzerinde kurumasına izin veriniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.

FLEXİMAT % 10 JEL ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi kurt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.

Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda FLEXİMAT % 10 JEL ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda FLEXİMAT % 10 JEL kullanılmamalıdır.

##### **Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:**

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

*Eğer FLEXİMAT % 10 JEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla FLEXİMAT % 10 JEL kullandıysanız:**

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, FLEXİMAT % 10 JEL'i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

*FLEXİMAT % 10 JEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **FLEXİMAT % 10 JEL'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için daha yüksek doz kullanmayınız.*

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, FLEXİMAT % 10 JEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:

Çok yaygın ( $\geq 1/10$ ); yaygın ( $\geq 1/100$  ila  $< 1/10$ ); yaygın olmayan ( $\geq 1/1000$  ila  $< 1/100$ ); seyrek ( $\geq 1/10.000$  ila  $< 1/1000$ ); çok seyrek ( $< 1/10.000$ ); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

FLEXİMAT % 10 JEL, geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

#### **Deri ve deri altı doku hastalıkları**

Yaygın olmayan: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, deri döküntüsü, bazen kabarcıklar veya ürtiker tarzı lokal deri reaksiyonları

Seyrek: Aşırı duyarlık reaksiyonları veya lokal alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

*Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.*

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. FLEXİMAT 'ın saklanması**

*FLEXİMAT % 10 JEL'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLEXİMAT % 10 JEL'i kullanmayınız.*

#### **Ruhsat Sahibi:**

RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayi A.Ş.  
Batı Sitesi Mah. Coşkun İrmak İş Merkezi  
274 Sok No: 120/121  
Yenimahalle / ANKARA

#### **Üretici:**

Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.  
Tem Otoyolu Kandaklar Mevkii  
Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatının onaylandığı gün, ay ve yıl.