

KULLANMA TALİMATI

ACCUZIDE® FORT 20 mg/25 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 25 mg hidroklorotiyazid
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat, magnezyum karbonat, povidon K 25, krospovidon, magnezyum stearat, opadry pink OY-S-6937 (Hipromeloz (E464), hidroksipropil selüloz, titanyum dioksit (E 171), kırmızı demir oksit (E172ii), sarı demir oksit (E172iii), macrogol 400), kandelila wax

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ACCUZIDE FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ACCUZIDE FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ACCUZIDE FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ACCUZIDE FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ACCUZIDE FORT nedir ve ne için kullanılır?

- ACCUZIDE FORT yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır.
- Her bir film kaplı tablet, 20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 25 mg hidroklorotiyazid içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
- ACCUZIDE FORT pembe, yuvarlak, bikonveks, film kaplı tablettir.
- Kinapril anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri; hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü olarak adlandırılan ilaç gruplarına aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek ve vücudunuzdaki fazla suyun atılmasını sağlayarak damarlardaki basıncı azaltır.
- ACCUZIDE FORT, yüksek tansiyon tedavisinde tek bir etkin madde içeren ilaç ile tedavinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılır.

2. ACCUZIDE FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACCUZIDE FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Kinapril, hidroklorotiyazid, sülfonamid grubu antibiyotiklere (bakterilere karşı bir ilaç) veya ACCUZIDE FORT'un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
- Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
- Kalıtsal, nedeni bilinmeyen ya da alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjioödem),
- Böbrek hastalığınız varsa
- Kalpten çıkan ana damarınızda darlık varsa (aort stenozu)
- Şeker hastalığı olanlarda kan basıncı düşürmek için aliskiren içeren bir ilaç kullanılıyorsa

ACCUZIDE FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Hamile kalma potansiyeliniz varsa,
- Alerji ya da astımınız varsa,
- Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,
- Böbrek bozukluğu olanlarda kan basıncı düşürmek için aliskiren içeren bir ilaç kullanılıyorsa
- Diyabet (şeker) veya gut (damla) hastalığınız varsa,
- Kan diyaliz makinesi (yapay böbrek - hemodiyaliz) kullanıyorsanız,
- Başka kan basıncı ilacı alıyorsanız,
- İdrar yapma problemi yaşıyorsanız,
- Ana atardamarınızda daralma varsa,
- Başka ilaçlar kullanıyorsanız,
- Kan basıncı ve sıvı dengesini düzenleyen bir sistem olan renin anjiyotensin sistemini etkileyen başka bir ilaç kullanıyorsanız
- Bağ dokusu hastalığınız (dermatomiyozit, lupus eritematozus, polyarteritis nodosa gibi) varsa,
- Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),
- Duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması).
- Alkol ya da uyku hapi kullanıyorsanız.
- Kalp hastalığınız varsa

ACCUZIDE FORT'un etkin maddelerinden hidroklorotiyazid; geçici miyop ve göz içi basıncının artması (glokom) ile sonuçlanabilecek bir reaksiyona neden olabilir. Görüş keskinliğinizde azalma veya göz ağrınız olursa derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ACCUZIDE FORT aç ya da tok alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACCUZIDE FORT kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız ACCUZIDE FORT kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ACCUZIDE FORT, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACCUZIDE FORT laktoz monohidrat (birçeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACCUZIDE FORT ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

- Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar,
- Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,
- Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),
- Lityum (depresyon tedavisi için bir ilaç),
- Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroid antiinflamatuar ilaçlar; örn. aspirin, ibuprofen),
- Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),
- Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), kronik gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),
- Sindirim güçlüğü ve göğüste yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),
- Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),
- Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,
- Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),
- Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler).
- Anestezikler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ACCUZIDE FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- ACCUZIDE FORT'un normal dozu günde 1 tablettir. Eğer bu dozla kan basıncınız kontrol altına alınamazsa, doktorunuz günlük dozunuzu tek seferde 2 tablet ya da sabah ve akşam 1'er tablet olmak üzere 2 tablete çıkartabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

- ACCUZIDE FORT'u aç veya tok karnına alabilirsiniz.
- Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.
- ACCUZIDE FORT'u bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACCUZIDE FORT kullanması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

ACCUZIDE dozunu doktorunuz belirleyecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / karaciğer yetmezliğiniz varsa ACCUZIDE FORT'u kullanıp kullanamayacağınıza, başlangıç ve devam dozuna doktorunuz karar vermelidir.

Eğer ACCUZIDE FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACCUZIDE FORT kullandıysanız:

ACCUZIDE FORT'dan fazla kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir.

ACCUZIDE FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACCUZIDE FORT'u kullanmayı unutursanız:

Bir dozunuzu almayı unuttursanız; bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ACCUZIDE FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACCUZIDE FORT'u almayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ACCUZIDE FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ACCUZIDE FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Nefes alma güçlüğüne sebep olan yüz, dil ve boğazda şişme (anjioödem),
- Kusmaya sebep olan aşırı karın ağrısı (bağırsaklarda anjioödem),
- Kalp krizi (semptomlar göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, nefes daralması veya nefes almada zorlanmayı içerebilir), kalp atımının hızlanması,
- Kollarda, bacaklarda güçsüzleşme ya da konuşma güçlüğü (felç belirtileri),
- Kurdeşen dahil şiddetli deri döküntüsü, şiddetli kaşıntı, kabarıklık, ciltte şişme ve soyulma, mukoza iltihabı (Stevens Johnson Sendromu),

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACCUZIDE FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Ayaktayken bayılma hissi. Bu tansiyonunuzun çok düştüğü anlamına gelebilir. ACCUZIDE FORT'la birlikte başka tansiyon ilacı, alkol alıyorsanız ya da susuz kaldıysanız veya diyalizdeyseniz bunun olma olasılığı artar. Bayılacak gibi hissettiğinizde, bu duygu geçene kadar uzanınız.
- Özellikle böbrek yetmezliğiniz veya damar hastalığınız varsa, şiddetli boğaz ağrısı ya da ciddi ağız yaraları, bu yetersiz beyaz kan hücreniz olduğu anlamına gelebilir ve enfeksiyon ya da ateş riskini arttırabilir.
- Göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve üfürüm sesi, çarpıntı,
- Hastalık hissi ile gelen şiddetli karın ve sırt ağrısı (pankreas iltihabı),
- Ciltte ve gözlerde sararma (sarılık).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

ACCUZIDE FORT ile tedavi gören hastalarda görülen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır. Bunlardan birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Diğer yan etkiler:

- Devamlı öksürük,
- Bulantı, kusma,
- İshal, sindirim güçlüğü, kabızlık, gaz,
- Mide rahatsızlığı veya ağrısı,
- Baş ağrısı, baş dönmesi,
- Al basması,
- Uykusuzluk,
- Yorgunluk, halsizlik,
- Üşütme, bronş iltihabı ya da viral enfeksiyonlar
- Sırt, göğüs, kas ve eklem ağrıları (gut)
- Deride döküntü, kaşıntı,
- Işığa karşı duyarlılık,
- Böbrek rahatsızlığı (doktorunuz risk görürse tahliller isteyebilir),
- Kan damarlarının genişlemesi

Daha seyrek yan etkiler:

- Kalp atışında hızlanma,
- Kısmi felç,
- Terlemede artış, sıcaklık hissi
- Ağız ve boğazda kuruluk,
- Saç dökülmesi,
- Ereksiyonun sağlanamaması, sürdürülememesi,
- İdrar yolu enfeksiyonu,
- Kol ve bacakta uyuşukluk ve karıncalanma,
- Deride içi sıvı dolu kesecikler (blistir),

- Depresyon, sinirlilik,
- Zihin karışıklığı,
- Kulakta çınlama,
- Görmede bulanıklık, göz yorgunluğu
- Tat duyusunda bozukluk.
- Bayılma
- Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
- Sinüs iltihabı sinüzit
- Anemi
- Karaciğer iltihabı (hepatit)
- Akciğerlerde havayolu daralması (bronkospazm)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ACCUZIDE FORT'un saklanması

ACCUZIDE FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACCUZIDE FORT'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACCUZIDE FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

Üretici: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg - Almanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.