

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/127/pursennid-12-mg-40-draje>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/A06AB06>

KULLANMA TALİMATI

PURSENNİD draje

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir draje 12 mg senna glikozitlerine eşdeğer 20 mg senna ekstresi kalsiyum tuzu içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Jelatin, stearik asit, glukoz, talk, mısır nişastası, laktoz, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit (E171), koloidal silika, akasya, talk, sukroz, setil palmitat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***PURSENNİD nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***PURSENNİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***PURSENNİD nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***PURSENNİD'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. PURSENNİD nedir ve ne için kullanılır?

- PURSENNİD, şeker kaplı – draje formunda bir ilaçtır ve her bir draje etkin madde olarak 12 mg senna glikozitlerine eşdeğer miktarda senna ekstresi kalsiyum tuzu içerir.
- PURSENNİD drajeler, kahverengimsi, yuvarlak, bikonveks şeker kaplı tabletler görünümündedir.
- PURSENNİD, 40 draje içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.
- PURSENNİD, “stimulan laksatifler” denilen, kabızlık tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir. Barsak hareketliliğini 6 ila 12 saat içinde sağlar.

2. PURSENNİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sürekli kabızlık, öncelikle lifli beslenme (ör. meyve, sebze, tahıllar) ile birlikte yeterli sıvı alımı veya fiziksel aktivite ile tedavi edilmelidir.

PURSENNİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Senna glikozitlerine veya PURSENNİD’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa,
- bağırsak boşaltıcı (laksatif) almamanız gerektiği söylendiyse
- İltihabi bağırsak hastalığınız (örn; Crohn hastalığı ve ülseratif rektokolit) varsa
- Su ve elektrolit eksikliği (örn; potasyum seviyesinde düşme) ile birlikte şiddetli su kaybı (dehidratasyon) tanısı konmuşsa
- Sık sık bulantı ve hasta gibi hissediyorsanız veya ara sıra mide ağrınız oluyorsa (bu mide veya karının hassas ve tahriş olduğu anlamına gelebilir.)
- Keskin veya kalıcı mide ağrınız varsa veya hareketleriniz sırasında karın dokunma ya da çarpmalara karşı hassas ise
- Tanısı konulmamış kısa süreli veya kalıcı karın ağrınız varsa (apandisit, barsak tıkanması veya inflamatuvar barsak hastalığının göstergesi olabilir.)

- İshal, kusma veya mide krampı şikayetleriniz varsa

PURSENNİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- PURSENNID tedavisi sırasında kalıcı karın ağrınız olursa
- Kabızlığınız devam eder veya daha kötüleşirse – PURSENNID almayı durdurunuz ve doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
- Yakın zamanda karın ile ilgili cerrahi bir operasyon geçirdiyse

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadığı sürece PURSENNID'i 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız, alışkanlığa neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PURSENNİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PURSENNID'i yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Hamileyseniz, PURSENNİD'i, ancak doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bebeğinizi emziriyorsanız, ancak doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

PURSENNİD tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

PURSENNİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PURSENNID laktoz, glukoz, sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (rahatsızlık verici hassasiyet) olduğu söylenmişse ve şeker (diyabet) hastalığınız varsa bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

- Kalp bir kalp ilacı (kinidin sülfat, kardiyak glikozitler, antiaritmikler, diüretikler) alıyorsanız,
- İltihaplanma tedavisi için kortikosteroid adı verilen ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
- PURSENNID kullanırken idrar testi yaptırıcaksanız, bu ilacı kullandığınız konusunda doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. İdrarda renk değişikliğine neden olabildiği için PURSENNID idrar testlerini etkileyebilir

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PURSENNİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

PURSENNID'i normal barsak fonksiyonlarınızı sağlayacak en düşük dozda alınız. Barsak fonksiyonlarınız düzelirse dozu artırmayınız. Önerilen en yüksek dozu (6 draje) aşmayınız.

PURSENNİD'in günde 1 defa (tek doz halinde) alınması önerilmektedir.

Yetişkinlerde:

Günde 1 veya 3 draje alınız. Doz, vücut ağırlığınıza göre değişebilir.

Çocuklarda:

27.5 kg ve 6 yaşın üstündeki çocuklar 1 draje kullanabilirler. Günlük doz 2 drajeyi geçmemelidir.

PURSENNİD'i doktor tavsiyesi olmadan 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PURSENNID'i, gece yatmadan önce, yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile almanız önerilir.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

PURSENNID'i 6 yaşın altındaki çocuklarda doktor gözetiminde olmadığı sürece kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

PURSENNID'in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

PURSENNID'in böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer PURSENNİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PURSENNİD kullandıysanız:

PURSENNİD'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PURSENNID'in aşırı dozda kullanımı bulantı, ishal, karın ağrısı veya kramplara neden olabilir.

Eğer kaza ile aşırı dozda PURSENNID kullandıysanız bol miktarda sıvı (özellikle meyve suyu) alınız ve doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

PURSENNİD'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PURSENNİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PURSENNİD'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar (nefes almada ya da yutkunmada zorluk; yüz, dudaklar, dil ya da boğazda şişme; ciltte kırmızı kurdeşen ya da yumrularla birlikte şiddetli kaşınma)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PURSENNİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Karın ağrısı, bulantı ve aşırı su kaybıyla birlikte ishal; kabızlığın devam etmesi ya da kötüleşmesi belirtileriyle atonik barsak
- Mide ya da karında kramplar, karın ağrısı ve barsak ağrısı
- Böbrek rahatsızlıkları
- Kalsiyum, potasyum ve magnezyum eksikliği
- Adrenal bezin etkinliğinde artış
- Aşırı su kaybı
- Kaslarda kramplar ve güçsüzlük
- Tuz eksikliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- İdrarda renk değişikliği

Bunlar PURSENNİD'in hafif yan etkileridir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PURSENNİD'in saklanması

PURSENNİD'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PURSENNİD'i kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PURSENNİD'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretim Yeri : Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

(gün.ay.yıl)