

KULLANMA TALİMATI

ZİNCO-Kaşık 15 mg/5 mL Şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 5 mL (1 kaşık) şurup 15 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde)

Yardımcı maddeler: Sukroz, metil paraben, gliserin, portakal esansı, FD&C yellow #6 (E110) ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1- **ZİNCO-KAŞIK nedir ve ne için kullanılır?**
- 2- **ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3- **ZİNCO-KAŞIK nasıl kullanılır?**
- 4- **Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5- **ZİNCO-KAŞIK'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1 - ZİNCO-KAŞIK nedir ve ne için kullanılır?

ZİNCO-KAŞIK, çinko içeren şuruptur ve alüminyum ile kapatılmış PET/PE kaşıklarda, her bir kaşıқта (5 ml) 15 mg çinko (çinko sülfat heptahidrat halinde) içerir.

Her bir kutuda; her biri bir kullanımlık, şeffaf OPP poşet ile ambalajlanmış (5 ml) 20 veya 28 kaşık bulunur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

2 – ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZİNCO-KAŞIK'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Çinko tuzlarına veya ZİNCO-KAŞIK'ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise

ZİNCO-KAŞIK'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNCO-KAŞIK'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCO-KAŞIK bu besinlerle birlikte kullanılmalıdır.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNCO-KAŞIK'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır.

Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmalıdır.

Çinko florokinolon grubu antibakteriyellerin (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.

Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 – ZİNCO-KAŞIK nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

- ZİNCO-KAŞIK yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 - 2 kaşık kullanılır.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Çinko eksikliğinin önlenmesinde;

	Günlük doz (mg)	Günlük doz (kaşık)
4 yaş ve üzerindeki çocuklarda	15 mg	1 kaşık
Yetişkinlerde	15 - 30 mg	1 - 2 kaşık
Hamilelerde	15 mg	1 kaşık
Emzirenlerde	30 mg	2 kaşık

Çinko eksikliğinin replasman tedavisinde;

	Günlük doz (mg)	Günlük doz (kaşık)
Akrodermatitis Enteropatika Wilson hastalığı	45 mg	3 kaşık
1-5 yaş	45 mg	3 kaşık
6-15 yaş	75 mg	5 kaşık

Uygulama yolu ve metodu:

- ZİNCO-KAŞIK sadece ağızdan kullanım içindir.
- Direkt olarak kaşıktan içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı yukarıda verildiği gibidir.

Yaşlılarda kullanım:

ZİNCO-KAŞIK'ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ZİNCO-KAŞIK'ın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer ZİNCO-KAŞIK'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla ZİNCO-KAŞIK kullandıysanız:

ZİNCO-KAŞIK' dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi ve kusma.

ZİNCO-KAŞIK' ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZİNCO-KAŞIK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ZİNCO-KAŞIK ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNCO-KAŞIK'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZİNCO-KAŞIK'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Tansiyon düşüklüğü, kalp ritim bozukluğu, potasyum eksikliğinde kalp grafisi değişiklikleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

- Kusma
- Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni)
- Mide bulantısı
- Karın ağrısı
- Hazımsızlık
- Baş ağrısı
- Sinirlilik
- Uyuşukluk
- Mide hassasiyeti
- Gastrit
- Baş dönmesi

Bunlar ZİNCO-KAŞIK'ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5 – ZİNCO-KAŞIK'ın Saklanması

ZİNCO-KAŞIK' 1 çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Kaşığın veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce ZİNCO-KAŞIK'ı kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNCO-KAŞIK'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks: 0216 456 65 79

e-mail: info@berko.com.tr

Üretim Yeri: Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adres: Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon: 0 216 592 33 00

Faks: 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı 08/12/2011 tarihinde onaylanmıştır.