

## KULLANMA TALİMATI

### FELDEN JEL %0.5

#### Topikal olarak haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** 5 mg Piroksikam
- **Yardımcı maddeler:** Carbopol 940 (Karboksivinil Polimer)  
Propilen glikol  
Etil alkol  
Benzil alkol  
Diizopropanol amin  
Hidroksietil selüloz  
Saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### Bu Kullanma Talimatında:

1. **FELDEN JEL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FELDEN JEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FELDEN JEL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FELDEN JEL'in saklanması**

#### 1. FELDEN JEL nedir ve ne için kullanılır?

FELDEN JEL berrak, açık sarı renkte bir jeldir. Haricen kullanılır.

Jelin her gramı 5 mg piroksikam isminde etkin madde içerir. FELDEN JEL 50 g'lık tüplerde sunulur.

FELDEN JEL'in etkin maddesi piroksikamdır, non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç gurubuna dahildir. FELDEN JEL etkilenen kas ve eklem üzerindeki cilde sürüldüğünde, eklemlerdeki ve kaslardaki şişliği azaltmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur.

FELDEN JEL, romatizma, burkulma, incinme ve eklemde (diz, bilek, ayak bileği vs) hafif (osteoartrit) kireçlenme tedavisinde kullanılır.

## 2. FELDEN JEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### **FELDEN JEL’i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eđer gemiřte FELDEN JEL’e, piroksikamın herhangi bařka bir formuna, aspirine ya da ađrılı kas ve eklem tedavisinde kullanılan diđer ilalara alerjik reaksiyon gsterdiyseniz, kařıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma glđ, astım, burunda polip geliřimi, burun akıntısı, kurdeřen veya bař ve boyunda řiřme olduysa.
- Eđer lokal tahriř geliřirse FELDEN JEL kullanımını bırakınız.
- Gze, mukozaya, aık yaraya ve uygulama yerinde deri hastalıđı varsa kullanmayınız.

### **FELDEN JEL’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

İlalar her zaman herkes iin uygun deđildir. Doktorunuz FELDEN JEL kullanmadan nce gemiřte ya da řimdi ařađdakilerin sizde olup olmadığını bilmelidir:

- Eđer karaciđer rahatsızlıđınız varsa,
- Eđer bbrek rahatsızlıđınız varsa.

FELDEN JEL’in 12 yařın altındaki ocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FELDEN JEL’in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmez.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FELDEN JEL’in emziren annelerde kullanımı edilmez.

### **Ara ve makine kullanımı**

FELDEN JEL’in ara ve makine kullanımınıza etkisi olması beklenmez.

### **FELDEN JEL’in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

FELDEN JEL propilen glikol ierir, bu da ciltte iritasyona neden olabilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

FELDEN JEL’in diđer ilalarla bilinen bir etkileřimi yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## 3. FELDEN JEL nasıl kullanılır?

**Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

- FELDEN JEL'i her zaman, aynen doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. FELDEN JEL deride kalmayana kadar ovarak sürünüz. Bunu günde 3-4 kez yapınız. Belirtilerinizde iyileşme olmazsa doktorunuza söyleyiniz.
- Doktorunuz ya da eczacınıza danışmadan FELDEN JEL'i 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
- FELDEN JEL'i zarar görmüş deriye; mesela yaralı, çizik, enfeksiyonlu ya da iltihaplı deriye sürmeyiniz.
- FELDEN JEL'i gözün yakınlarına, buruna, ağıza, üreme organlarına ya da anüse uygulamayınız. Bu bölgelere temas halinde, su ile durulayınız.
- FELDEN JEL uygulanmış bölgeyi kumaş ya da bandaj ile kapatmayınız.

**Uygulama yolu ve methodu:**

- FELDEN JEL sadece haricen, deriye uygulanır.
- Tüpü delmek için kapağı ters çevirip tüpün ağız kısmına çevirerek batırınız. Jeli etkilenmiş bölgeye 3 cm genişliğinde sürünüz. Kılavuz olarak aşağıdaki skalayı kullanabilirsiniz.

Skala:



- FELDEN JEL'i kullandıktan sonra her zaman kapağını kapatınız ve ellerinizi yıkayınız.

*Eğer FELDEN JEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla FELDEN JEL kullandıysanız ya da yanlışlıkla FELDEN JEL yuttuysanız:**

Eğer yanlışlıkla çok fazla FELDEN JEL kullandıysanız, herhangi bir yan etki oluşturması olası değildir.

Eğer yanlışlıkla bol miktarda ilacınızdan yuttuysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz ya da en yakın hastaneye ulaşınız.

*FELDEN JEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**FELDEN JEL'i kullanmayı unutursanız:**

FELDEN JEL'i kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda eğer bir sonraki uygulama saatiniz gelmediyse, aklınıza gelir gelmez kullanınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**FELDEN JEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

FELDEN JEL kullanmayı bıraktığınızda, ağrılarınız tekrarlayabilir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

#### 4. **Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, FELDEN JEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FELDEN JEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aniden güçlük ve gürültülü bir şekilde solumak
- Nefes almada güçlük
- Ateş
- Göz kapaklarında, yüzde ya da dudaklarda şişme
- Tüm vücudu etkileyen deri döküntüsü ya da kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FELDEN JEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

#### **FELDEN JEL'in sebep olabileceği diğer yan etkiler:**

- FELDEN JEL'in uygulandığı bölgede kızarıklık, döküntü ve/veya kaşıntı (örn. Egzema, temas iltihabı)
- Güneşe karşı deri hassasiyeti

#### **Yaygın olmayan yan etkiler:**

- Bulantı (hastalık hissi)
- Hazımsızlık
- Midede rahatsızlık
- Akciğerdeki hava yollarında daralma
- Nefes darlığı

Bu yan etkiler, FELDEN JEL'i kullanmayı bıraktığınız zaman kaybolmalıdır. Rahatsızlık devam ederse, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer bu yan etkiler ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### 5. **FELDEN JEL'in saklanması**

*FELDEN JEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FELDEN JEL'i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy - İSTANBUL

**Üretim Yeri:** Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. No:24 34010 Topkapı - İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*