

## **KULLANMA TALİMATI**

### **GE-ORAL**

**Oral solüsyon hazırlamak için toz karışım**

**Ağız yolu ile alınır.**

- **Etkin maddeler:** Bir poşet; 13,5 g Glukoz susuz, 2,6 g Sodyum klorür, 2,9 g Trisodyum sitrat di hidrat, 1,5 g Potasyum klorür ihtiva eder.

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de GE-ORAL'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **GE-ORAL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **GE-ORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **GE-ORAL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **GE-ORAL'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. GE-ORAL nedir ve ne için kullanılır?**

- GE-ORAL, her bir poşette 20,5 g toz karışım içeren 2 poşetlik karton kutuda takdim edilmektedir.
- İshalde vücuttan kaybolan su ve elektrolitlerin yerine koyulmasını sağlar.

#### **2. GE-ORAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **GE-ORAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Eğer, Glukoz, Sodyum klorür, potasyum klorür veya GE-ORAL' in herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz yada aşırı duyarlılığınız varsa GE-ORAL'i kullanmayınız. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır ; döküntü, yutkunma veya nefes almada zorluk, dudak, yüz, boğaz ve dilin şişmesi.

- Cerrahi müdahale gerektiren barsak tıkanması gibi durumlarda kullanılmamalıdır.

### **GE-ORAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

- \* İlacı kullanan çocuk 2 yaşın altında ise,
- \* Düşük sodyum veya potasyum diyetinde iseniz,
- \* Şeker hastası iseniz

GE-ORAL’i kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

24 saat bu karışımdan verilmesine rağmen, hala vücuttan su kaybı belirtileri (ağızda kuruluk, bingıldak ve gözlerde çökme, cilt esnekliği ve idrar miktarında azalma) bulunuyorsa veya ateş, kusma devam ediyorsa hemen hekime başvurulmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **GE-ORAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Diğer yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

GE-ORAL’in hamilelik sırasında güvenliliği kanıtlanmamıştır; fakat ürünün bu dönem sırasında bir zararlı etki oluşturduğu düşünülmektedir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmektedir. Yinede bu dönemde dikkatli kullanılmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

GE-ORAL’in araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

### **GE - ORAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Yardımcı madde bulunmamaktadır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin.*

### **3. GE - ORAL Nasıl Kullanılır?**

Sadece ağız yolu ile kullanım içindir.

GE-ORAL yalnızca kaynatılmış soğutulmuş suyla tamamen karıştırıldıktan sonra kullanılabilir. Kuru toz olarak alınmamalıdır. Kazara alınması halinde derhal doktorunuza başvurunuz.

**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- İshalli çocuk bir günde en az kilosunun sayısında çay bardağı dolusu karışımı içmelidir. ( 5 kilo ise 5 bardak ).
- Yetişkinler her sulu dışkılamadan sonra 1 bardak içebilir.
- İshal başlar başlamaz bu karışımın verilmesi tedavide önem taşır.
- İshalli bebeklere ve çocuklara içebildiği kadar bu karışımdan verilmelidir. Kolay içemeyen çocuklara 5 – 10 dakika ara ile kaşık kaşık verilebilir.
- Karışım ayran veya meyve suları ile karıştırılarak verilebilir.
- Bu karışımın verildiği sırada ishalleri bebek / çocuk uygun beslenmeye devam edilmelidir. Anne sütü alan bebeklerin sütü kesilmemelidir.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

- Çocuklar ve yetişkinler için bir litre (5 büyük su bardağı) kaynatılıp soğutulmuş içme suyu içine 1 poşet konup, iyice karıştırılarak eritildikten sonra içilir.

**Karışımın hazırlanması:**

Bir litre (5 büyük su bardağı) kaynatılıp soğutulmuş içme suyu içine 1 poşet konup iyice karıştırılarak eritildikten sonra içilir.

Karışım hazırlandıktan sonra serin bir yerde veya buzdolabında ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.

Herhangi bir nedenden dolayı artan karışım 24 saatten sonra kullanılmamalıdır.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:** GE - ORAL'in çocuklarda kullanımı, uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar kısmında belirtildiği gibidir.

**Yaşlılarda kullanım:** Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerle aynıdır.

**Özel kullanım durumları**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği:** Böbrek ve karaciğer hastalarında kullanılmaz.

*Eğer GE-ORAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla GE-ORAL kullandıysanız:**

*GE-ORAL'i kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Aşırı dozda alındığında alkali fazlalığı (alkaloz) meydana gelebilir.

**GE-ORAL'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.* İhtiyaç duyduğunuzda bir sonraki dozu alın.

**GE-ORAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

İlacın kesilmesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir etki görülmez.

Ancak, yeterli tedavi gerçekleşmeden ilaç kesilirse, tedaviye başlamadan önceki belirtiler ( ağızda kuruluk, bingıldak ve gözlerde çökme, cilt esnekliği ve idrar miktarında azalma) tekrar görülebilir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, GE-ORAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, GE-ORAL'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Döküntü, yutkunma ve nefes almada zorluk, yüz, boğaz ve dilin şişmesi gibi alerjik reaksiyon görülmesi durumunda.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Nabız atışlarında düzensizlik,
- Ritm bozukluğu,
- Potasyum eksikliğinin elektrokardiyografik olarak ortaya çıkması.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Tansiyon düşüklüğü.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. GE-ORAL'in saklanması**

*GE-ORAL'i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Ürün ışıktan uzakta ve 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Karışım hazırlandıktan sonra serin bir yerde veya buzdolabında ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.

**Herhangi bir nedenden dolayı artan karışım 24 saatten sonra kullanılmamalıdır.**

Poşetler güneş görmeyen ve rutubetsiz yerde saklanmalı ve yırtılmamasına özen gösterilmelidir.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Kartondaki son kullanma tarihinden sonra GE-ORAL'i kullanmayınız.*

Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GE-ORAL'i kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** KANSUK LABORATUARI San.ve Tic. A.Ş. • Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-İSTANBUL

**Üretici:** KANSUK LABORATUARI San. Ve Tic. A.Ş • Beşyol Mah. Eski Londra Asfaltı. No: 4 34620 Sefaköy-İstanbul

**Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.**