

## KULLANMA TALİMATI

### OCULOTECT FLUID steril göz damlası

Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 ml çözelti 50 mg polividon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum klorür, borik asit, sodyum klorür, sodyum laktat, potasyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür, enjeksiyonluk su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **OCULOTECT FLUID nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OCULOTECT FLUID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OCULOTECT FLUID nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OCULOTECT FLUID'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. OCULOTECT FLUID nedir ve ne için kullanılır?**

OCULOTECT FLUID, hemen hemen renksiz, berrak sulu çözelti şeklinde bir göz damlasıdır. Her 1 ml çözelti etkin madde olarak 50 mg polividon içerir.

OCULOTECT FLUID, 10 ml çözelti içeren saydam şişelerde takdim edilmektedir.

OCULOTECT FLUID, oftalmolojikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

OCULOTECT FLUID, kuru göz hastalığı dahil, göz kuruluğunda (gözyaşı filminin dayanıksız olduğu durumlarda gözyaşı yerine veya göz yüzeyinin nemlenmesinin yetersiz olduğu durumlarda) kullanılır.

### **2. OCULOTECT FLUID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**OCULOTECT FLUID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- OCULOTECT FLUID'in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

## **OCULOTECT FLUID'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer:

- Kontakt lens kullanıyorsanız.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **OCULOTECT FLUID'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Doktorunuz gerekli grmedike OCULOTECT FLUID'i hamilelik dneminde kullanmayınız. *Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Doktorunuz gerekli grmedike OCULOTECT FLUID'i emzirme dneminde kullanmayınız.

### **Ara ve makine kullanımı**

İlacın damlatılmasından hemen sonra grmede bulanıklık yařıyorsanız, ara ya da makine kullanmayınız.

### **OCULOTECT FLUID'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

OCULOTECT FLUID koruyucu olarak benzalkonyum klorr maddesini ierdiėinden gzde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuřak kontakt lenslerle temasından kaınınız. Uygulamadan nce kontakt lensi ıkartınız ve lensi takmak iin en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuřak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduėu bilinmektedir.

### **Diėer ilalar ile birlikte kullanımı**

Eđer:

- OCULOTECT FLUID ile birlikte bařka gz ilaları kullanıyorsanız iki ila uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz ve OCULOTECT FLUID'i gznze daima en son damlatınız.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. OCULOTECT FLUID nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıėı iin talimatlar:**

Doktorunuz tarafından bařka řekilde tavsiye edilmediėi takdirde gznze gnde 4 defa 1 damla uygulayınız. Doktorunuzun tavsiyelerine her zaman uyunuz.


### **Uygulama yolu ve metodu:**

Uygulamadan nce ellerinizi yıkayınız.

Solüsyonun kirlenme riski olduğundan, şişenin ucunun herhangi bir yüzeye temasından ve göze hasar verebileceğinden gözle temasından kaçınınız.

Aşağıda belirtildiği şekilde gözünüze uygulayınız:

1. Başınızı arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz.
2. Diğer elinizle şişeyi baş aşağı, gözünüzün üstünde dik olarak tutunuz. Yavaşça sıkarak bir damla damlatınız. Kabın ucunu eliniz veya gözünüze değdirmemeye dikkat ediniz.
3. Damlattıktan sonra gözünüzün iç ucuna parmak ucunuz ile 1-2 dakika bastırınız. Bu, ilacın gözyaşı kanallarından buruna akmasını önler.



**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

OCULOTECT FLUID'in çocuklarda etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

OCULOTECT FLUID'in böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

*Eğer OCULOTECT FLUID'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla OCULOTECT FLUID kullandıysanız:**

Çözeltinin fazlası gözden dışarıya akacağı için göze kazayla 1 damladan fazla damlatılması genelde bir sorun teşkil etmez.

*OCULOTECT FLUID'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**OCULOTECT FLUID'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

**OCULOTECT FLUID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, OCULOTECT FLUID'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, OCULOTECT FLUID'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OCULOTECT FLUID'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Gözde hafif ve geçici yanma ya da yapışkanlık hissi, tahriş.
- Görmede bulanıklık

Bunlar OCULOTECT FLUID'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. OCULOTECT FLUID'in saklanması**

*OCULOTECT FLUID'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.

Işıktan korumak için dış ambalajı içerisinde saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmı saklamayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OCULOTECT FLUID'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OCULOTECT FLUID'i kullanmayınız.

**Ruhsat sahibi:** Novartis Ürünleri  
34912 Kurtköy - İstanbul

**Üretici:** Excelvision AG  
Annonay/Fransa

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*