

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/171/eyestil-goz-damlasi-10-ml>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/S01XA>

KULLANMA TALİMATI

EYESTİL göz damlası – 10 ml

Göze uygulanır.

- **Etkin madde :**

100 ml’de, 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir.

- **Yardımcı maddeler :**

Disodyum fosfat dodekahidrat, monobazik sodyum fosfat, sodyum klorür, benzalkonyum klorür, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. *EYESTİL nedir ve ne için kullanılır ?*
2. *EYESTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *EYESTİL nasıl kullanılır ?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir ?*
5. *EYESTİL’in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. EYESTİL nedir ve ne için kullanılır ?

- EYESTİL, 10 ml’lik düşük yoğunluklu polietilen şişelerde kullanıma hazır steril göz damlasıdır.

EYESTİL, kuru göz hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılır.

2. EYESTİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EYESTİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :

- İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa EYESTİL’i kullanmayınız.

EYESTİL’i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Benzalkonyum klorür ierdiğıinden yumuřak kontakt lenslerle kullanımı kontrendikedir.
- Deterjan veya dezenfektan etkisi gsteren diđer gz czeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

EYESTİL’in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız .

Hamilelik srecinde EYESTİL’i , ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

EYESTİL’in emzirme dnemindeki etkisi bilinmemektedir.

Ara ve makine kullanımı

EYESTİL’in ara ve makine kullanımını engelleyecek hibir etkisi yoktur.

EYESTİL’in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

Eyestil 10 ml, 0.5 g Benzalkonyum klorr ierir. Benzalkonyum klorr yumuřak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. EYESTİL ve yumuřak kontakt lensin eř zamanlı olarak kullanımının gerekli olduėu durumlarda, uygulamadan nce kontakt lensi ıkartınız ve lensi takmak iin en azından 15 dakika bekleyiniz.

EYESTİL’in, ieriėinde bulunan yardımcı maddelere karřı ařırı bir duyarlılıėınız yoksa, bu yardımcı maddelere baėlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diđer ilalarla birlikte kullanımı

Sodyum hiyalronat, kuaterner amonyum tuzları mevcudiyetinde ckebilir. Bu bileřikleri ieren czeltilerle birlikte kullanmaktan kaınınız.

Eėer reeteli yada reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. EYESTIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

- EYESTIL’i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıtla bağlı olarak EYESTIL ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin EYESTIL’den tam yarar görmeyi sağlar. 1 ayı aşan tedavi periyotlarında kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu :

Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Yalnız oftalmik kullanım içindir.

Göze uygulanır.

Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız.

İlacı kullanırken ambalajın ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.

Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda Kullanımı :

Pediyatrik yaş grubunda, EYESTIL gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

Özel kullanım durumları :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer EYESTIL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EYESTIL kullandıysanız

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

EYESTIL’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EYESTIL’i kullanmayı unutursanız

Eğer EYESTIL’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EYESTIL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece EYESTIL kullanmaya devam ediniz.
Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, EYESTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

- Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu
- Kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeysel alerjik reaksiyonlar, keratit
- Kaşıntı, yanma

Bunlar EYESTIL’in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. EYESTIL’in Saklanması

EYESTIL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EYESTIL’i kullanmayınız.

Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EYESTIL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi :

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300
Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: 0212- 274 51 24
Fax : 0212- 272 15 68

Üretim yeri :

SIFI S.P.A.
'36,Via Ercole Patti 95020
Lavinaio- Aci S.Antonio

Katanya-İTALYA
Tel: 0039 095 792 21 11

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.