

## KULLANMA TALİMATI

### PROCTO-GLYVENOL supozituar

Rektal yoldan uygulanır.

- **Etkin madde:** Her bir supozituar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Supozituar kütlesi D, Supozituar kütlesi 35

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PROCTO-GLYVENOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROCTO-GLYVENOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROCTO-GLYVENOL'ün saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. PROCTO-GLYVENOL nedir ve ne için kullanılır?**

- PROCTO-GLYVENOL etkin madde olarak “tribenosid” ve “lidokain” içeren supozituar formunda bir ilaçtır. PROCTO-GLYVENOL supozituar, sarımsı-beyaz renkli, torpido şekilli çatlaksız kaygan, yumuşak olmayan görünümündedir.
- PROCTO-GLYVENOL, “topikal kullanılan diğer antihemoroidaller” adı verilen hemoroidlerin tedavisinde kullanılan ilaçları içeren bir gruba dahildir.

- PROCTO-GLYVENOL supozituar, 10 supozituar içeren orijinal kutusunda kullanıma sunulmaktadır.
- PROCTO-GLYVENOL, dış ve iç hemoroidlerin (rektal/anal bölgede ağrı, kaşıntı ve acıya neden olan damar şişliği) tedavisinde kullanılır.
- PROCTO-GLYVENOL'ün etkin maddelerinden biri olan tribenosid, küçük kan damarlarındaki iltihaplanmanın ve ağrıya neden olan maddelerin oluşmasının engellenmesinde bölgesel etki gösterir. Diğer etkin madde olan lidokain ise hemoroidlerden kaynaklanan kaşıntı, acı ve ağrının hızla hafiflemesini sağlayan bir lokal anesteziiktir.

## **2. PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **PROCTO-GLYVENOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Tribenosid, lidokain veya PROCTO-GLYVENOL'ün içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa

### **PROCTO-GLYVENOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer:

- Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa

PROCTO-GLYVENOL ile tedaviniz sırasında anal bölgenin temizliğine dikkat ediniz. Yeteri kadar egzersiz yapınız ve dışkıının yumuşak kalmasını sağlayacak herhangi bir önlem alınız.

Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da tıkanıklık (oklüzyon) olduğunda uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **PROCTO-GLYVENOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması**

PROCTO-GLYVENOL'ün uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- Hamile iseniz hamileliğinizin ilk 3 ayı boyunca PROCTO-GLYVENOL kullanmayınız.
- Hamileliğin 4. ayından itibaren, doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozu aşmadığınız sürece PROCTO-GLYVENOL kullanabilirsiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

- Bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuz tarafından tavsiye edilen dozu aşmadığınız sürece PROCTO-GLYVENOL kullanabilirsiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

PROCTO-GLYVENOL'un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

### **PROCTO-GLYVENOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PROCTO-GLYVENOL'un içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

PROCTO-GLYVENOL için herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PROCTO-GLYVENOL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız:

PROCTO-GLYVENOL'ü hemoroid belirtileri kaybolana kadar sabah ve akşam 1 supozitivar kullanmalısınız. Belirtiler azaldığında doz günde 1 supozitivar olacak şekilde azaltılabilir.

PROCTO-GLYVENOL'ü belirtiler ortadan kalkana kadar kullanınız. Belirtiler bir haftadan uzun süre devam ederse doktorunuza danışınız.

Önerilen dozu aşmayınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

PROCTO-GLYVENOL haricen, rektal yoldan bölgesel olarak uygulanır.

- PROCTO-GLYVENOL'ü yutmayınız.
- Gözler ile temasından kaçınınız.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

PROCTO-GLYVENOL'ü doktorunuza danışmadan çocuklarda kullanmayınız.

**Yaşlılarda kullanımı:**

PROCTO-GLYVENOL'ün yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

**Özel kullanım durumları:**

PROCTO-GLYVENOL, ağır karaciğer hasarı olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

*Eğer PROCTO-GLYVENOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PROCTO-GLYVENOL kullandıysanız:**

PROCTO-GLYVENOL ile doz aşımına rastlanmamıştır.

Eğer PROCTO-GLYVENOL kaza ile yutarsanız derhal doktorunuza danışınız.

*PROCTO-GLYVENOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmayı unutursanız:**

Eğer PROCTO-GLYVENOL'ün bir dozunu almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında uygulayınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PROCTO-GLYVENOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

PROCTO-GLYVENOL genellikle iyi tolere edilmektedir.

**Aşağıdakilerden biri olursa PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (yutma güçlüğüne neden olabilir)
- Nefes almada güçlük
- Ciltte şiddetli kaşıntı
- Kalp atışında düzensizlikler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROCTO-GLYVENOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Uygulama yerinde ya da bu bölgenin dışında,

- Yanma,
- Kaşıntı
- Kızarıklık

Bunlar PROCTO-GLYVENOL'ün hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. PROCTO-GLYVENOL'ün saklanması**

*PROCTO-GLYVENOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROCTO-GLYVENOL'ü kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *PROCTO-GLYVENOL'ü* kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Dođan Araslı Cad. No:219

34510 Esenyurt / İSTANBUL

**Üretici** : Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*