

KULLANMA TALİMATI

LACRYVISC® Steril Oftalmik Jel, 10 g

Göze uygulanır.

- *Etkin madde:* 10 g'da 30 mg karbomer
- *Yardımcı maddeler:* sorbitol, benzalkonyum klorür, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?*
2. *LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *LACRYVISC nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *LACRYVISC'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?

LACRYVISC, göz kuruluğu vakalarında göz yüzeyinin eksik veya bozuk yapıda ıslatılmasından kaynaklanan durumlarda gözyaşının yerine geçer.

LACRYVISC, suni gözyaşları olarak adlandırılan bir grup ilaçtan biridir.

LACRYVISC, 10 g'lık lamine bir tüpte sunulan, hafif şeffaf viskoz bir jeldir.

2. LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
- Kontakt lens gözünüzde iken

LACRYVISC'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer;

- Bařka ilaçlar da kullanıyorsanız. Lütfen 'Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı' bölümünü okuyunuz.
- Kontakt lens kullanıyorsanız. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC kullanılmamalıdır.
- Gözünüzde ağrı, görüş deęişiklikleri, gözünüzde tahriř, geçmeyen bir kızarıklık meydana gelirse, ve durumunuz kötüleřir veya 3 günden uzun süre devam ederse, kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danıřınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız

LACRYVISC'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

LACRYVISC göze sürülerek kullanılır. Ürünü bařka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiđi şekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve ieceklerle bir iliřkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

LACRYVISC'in hamilelik süresince kullanımına iliřkin herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, ürün farmakolojik olarak etkin bir madde iermediđinden, cenin üzerinde tehlikeli bir etki beklenilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

LACRYVISC'in emzirme süresince kullanımına iliřkin herhangi bir veri yoktur. Bununla birlikte, ürün farmakolojik olarak etkin bir madde iermediđinden, çocuk üzerinde tehlikeli bir etki beklenilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Diđer göz jellerinde olduđu gibi, jel gözün yüzeyi üzerinde tamamen yayılana kadar geçici olarak görüşünüz bozulmuř olabilir. Bu etki geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

LACRYVISC'in ieriđinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

LACRYVISC'in iindeki koruyucu (benzalkonyum klorür) lenslerin rengini bozabilir ve göz tahriřine neden olabilir. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC'i kullanmayınız. LACRYVISC'i kullanmadan önce kontak lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15 dakika bekleyiniz.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eđer birden fazla göz ilacı kullanacaksanız, uygulamalar arasında en az 5 dakikalık bir ara olmalıdır. Göz pomadları ve jelleri en son uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LACRYVISC nasıl kullanılır?



▪ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LACRYVISC’i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Genellikle günde dört kez veya doktorun önerdiği kadar bir miktar jel, hasta göz(ler)e uygulanır.

LACRYVISC’i yalnızca gözlerinize kullanınız.

▪ Uygulama yolu ve metodu:



1. LACRYVISC tüpünü ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Tüpün kapağını açınız.
4. Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.
5. Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir “kese” oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Pomad buraya sürülecektir.
6. Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.
7. Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Pomada mikrop bulaşabilir.
8. Pomad şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız.
9. LACRYVISC’i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve pomadın gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu LACRYVISC’in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.
10. Eğer pomadı iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Eğer jeli gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

▪ Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

▪ **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LACRYVISC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACRYVISC kullandıysanız:

LACRYVISC, ihtiyaç oldukça sıkça kullanılabilir, bu nedenle gözlere uygulandığı sürece doz aşımı mümkün değildir. Tüm tüpün yutulması durumunda bile herhangi bir istenmeyen etki görülmeyecektir.

LACRYVISC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LACRYVISC'i kullanmayı unutursanız:

LACRYVISC ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Kullanabildiğiniz kadar kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LACRYVISC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi sonlandırmanız durumunda, kuru göz belirtileri tekrar oluşabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LACRYVISC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Göz hastalıkları

Yaygın: bulanık görme, gözde rahatsızlık, kızarıklık, ağrı veya kaşıntı, gözde anormal hassasiyet, gözyaşında artış, göz kapağı kenarında çapaklanma

Yaygın olmayan: kuru göz, gözde akıntı, gözde şişme veya tahriş, göz kapağı iltihabı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: burun akıntısı, deri iltihabı, gözün etrafında şişme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LACRYVISC'in saklanması

LACRYVISC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. *Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACRYVISC'i kullanmayınız. Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.*

Açıldığı tarih:

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Tüp ilk kez açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805
Beykoz / İSTANBUL

Üretici: s.a. ALCON Couvreur n.v.
Rijksweg 14 2870 Puurs, Belçika

Bu kullanma talimatı 22.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.