

KULLANMA TALİMATI

SİTOREL 20 mg Film Tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet 20 mg Trimetazidin dihidroklorür içermektedir.
- **Yardımcı maddeler:** Mannitol, nişasta, povidon, talk, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, polietilen glikol 400, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **SİTOREL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SİTOREL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SİTOREL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SİTOREL'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SİTOREL nedir ve ne için kullanılır?

SİTOREL film kaplı tablet, 60 tableten oluşan blister ambalajda bulunmaktadır.

SİTOREL,

- Angina pectoris (göğüs ağrısı) krizlerinin önlenmesinde,
- Dolaşım kaynaklı olan görsel bozuklukların tedavisinde yardımcı ilaç olarak
- Baş dönmesi, kulak çınlaması, vızıltı ve ıslık sesi gibi (çevre ile ilgili olmayan) seslerin duyulmasının tedavisinde yardımcı ilaç olarak kullanılmaktadır.

2. SİTOREL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİTOREL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- Eğer etkin maddeye veya SİTOREL'in içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).
- Emzirme döneminde (bkz. Gebelik ve emzirme sırasında kullanım)

SİTOREL 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Bu ilaç anjina krizlerinin oluşumunu engellemede etkilidir. Başlamış olan anjina krizlerinde iyileştirici bir tedavi değildir.
- Stabil olmayan anjina pektoris hastalığında başlangıç tedavisi değildir.
- Miyokard enfarktüs tedavisi için uygun değildir.
- Anjina krizi durumunda doktorunuza bilgilendiriniz. Tedaviniz gözden geçirilip tahlil yaptırmanız gerekebilir ve tedaviniz değiştirilebilir.

SİTOREL' in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİTOREL'in hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİTOREL emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makine kullanımı

SİTOREL'in araç veya makina kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda almışsanız – hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere – lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SİTOREL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SİTOREL doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde kullanılmalıdır. Bir tablet (20 mg) günde üç kez, yemek ile birlikte alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

SİTOREL ağızdan kullanım içindir.
Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.
Tabletleri çiğnemeyiniz.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz SİTOREL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. 3 aylık tedaviden sonra tedavinin yararı yeniden değerlendirilmeli, tedaviden cevap alınmama durumunda ilaca devam edilmemelidir.

Eğer SİTOREL' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİTOREL kullandıysanız:

SİTOREL' den almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SİTOREL' i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

SİTOREL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SİTOREL' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler oluşabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Mide rahatsızlıkları (bulantı, kusma),
- Çok nadir olarak parkinson hastalığı semptomları (ellerde titreme, katılık, hareketsizlik) görülebilir. Bu semptomlar tedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. SİTOREL' in saklanması

SİTOREL' i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SİTOREL' i 25°C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİTOREL' i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi
No: 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul

Üretici: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:13
34196 Yenibosna – İstanbul.

*Bu kullanma talimatı/.../..... tarihinde onaylanmıştır.
(gün ay ve yıl)*