

KULLANMA TALİMATI

VASOSERC FORT tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol (E 421),mikrokristalin selüloz, koloidal silisyum dioksit,talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. **VASOSERC FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VASOSERC FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VASOSERC FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VASOSERC FORT'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1.VASOSERC FORT nedir ve ne için kullanılır ?

VASOSERC FORT blister içinde 30 tablet olarak ambalajlanmış tablettir.
VASOSERC FORT etkin madde olarak 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Meniere hastalığının tedavisinde kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.

- Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri
- İşitme kaybı veya işitme zorluğu
- Kulak çınlaması

Kulaktaki bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkan baş dönmesi belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. VASOSERC FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VASOSERC FORT sadece yetişkinlerde kullanılmaktadır.

VASOSERC FORT'u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer betahistin dihidroklorüre veya VASOSERC FORT'un herhangi bir bileřenine karřı ařırı duyarlılıđınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

VASOSERC FORT'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer;

- Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu),
- Bronşiyal astım veya,
- Midede ülser hikayeniz varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuz tarafından izlenmeniz gerekir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

VASOSERC FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

VASOSERC FORT'u, yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birlikte alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından söylenmedikçe hamilelik sırasında VASOSERC FORT'u kullanmayınız. Çünkü ilacın hamilelik esnasında oluşabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

VASOSERC FORT'un anne sütüne geçip geçmediđi bilinmemektedir.

Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeđinize olası risklerine karřı değerlendirmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Arařtırmalar VASOSERC FORT'un araç ve makine kullanma yeteneđi üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.

VASOSERC FORT'in içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriđinde bulunan mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VASOSERC FORT'un diđer ilaçlarla etkileřimi bilinmemektedir.

Eđer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VASOSERC FORT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

- VASOSERC FORT'un yetişkinler için önerilen günlük dozu günde 3 defa olmak üzere 1-2 tablettir. Günde 3 tablettir (48 mg betahistin dihidroklorür) fazla kullanılmamalıdır.
- Tabletler ağız yoluyla yeterli miktarda suyla alınmalıdır.
- Hastalığınızdaki iyileşme sadece birkaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin birkaç ayından sonra elde edilebilir.
- Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz VASOSERC FORT'un dozunu size göre ayarlayacaktır.
- Tedavinize erken dönemde başlaması durumunda, hastalığın ilerlemesinin ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybının önlediğine dair bulgular mevcuttur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

- Sadece ağızdan kullanım içindir.
- Tabletler öğün arasında veya yemekten kısa bir süre sonra, yeterli miktarda suyla alınmalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :

Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, VASOSERC FORT'un, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı :

Yetişkinlerde VASOSERC FORT dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda VASOSERC FORT dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer VASOSERC FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOSERC FORT kullandıysanız

VASOSERC FORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VASOSERC FORT'tan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, aşağıdaki semptomlar görülebilir: Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, kalp atım sayısında artma, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, yutkunmada güçlük.

Aşırı doz tedavisi doktorunuzun belirleyeceği standart destek tedavi yöntemlerini içermektedir.

VASOSERC FORT'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VASOSERC FORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik arařtırmalarda, VASOSERC FORT ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiřtir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi VASOSERC FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Ařağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Çok nadir olarak, deri aşırı duyarlılık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.

Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.

'Bunlar VASOSERC FORT'un hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VASOSERC FORT'un Saklanması

VASOSERC FORT'u çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altında, oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOSERC FORT'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpařa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tunç Cad. Hoşdere Mevkii, No : 3
Hadımköy / İstanbul

Bu kullanma talimatı ../../. tarihinde onaylanmıştır.