

## KULLANMA TALİMATI

### PROZAC 20 mg/5 ml likit Ağızdan alınır

- **Etkin madde:** Fluoksetin hidroklorür  
Her 5 ml likit 20 mg fluoksetine eşdeğer miktarda fluoksetin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Benzoik asit, sukroz, gliserin, tatlandırıcı olarak nane (eser miktarda alkol içerir) ve saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PROZAC nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROZAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROZAC nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROZAC'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. PROZAC nedir ve ne için kullanılır?**

PROZAC 70 ml'lik kahverengi şişelerde, şeffaf, renksiz ve nane kokulu bir çözeltilidir.

PROZAC seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanları olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır

- Majör depresyon
- Obsesif kompulsif bozukluk (OKB olarak da tanınır)
- Bulimia nervoza – aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartmanın azaltılması için psikoterapinin yanında PROZAC kullanılır
- Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk)

#### **2. PROZAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

- Fluoksetine ya da PROZAC'ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa. **Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da**

**dudaklarda şişme ya da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza bildiriniz.**

- Seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri ya da geri dönüşümlü monoamin oksidaz inhibitörleri tip A (aynı zamanda depresyon tedavisinde de kullanılan MAOI'ler olarak da bilinir) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, çünkü bu durumda ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir. MAOI'lere örnek olarak nialamid, iproniazid, selegelin, moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazid ve toloksaton verilebilir.

Fluoksetin tedavisi, ancak geri dönüşsüz MAOI (örneğin tranilsipromin) tedavisi kesildikten 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Bununla birlikte, fluoksetin tedavisi, MAOI-A olarak adlandırılan bazı MAOI'ler (örneğin moklobemid) kesildikten sonraki gün başlatılabilir.

PROZAC almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta MAOI'lerinden hiçbirini almayınız. Eğer PROZAC uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuz bu arayışı uzatmayı düşünmelidir.

- Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız PROZAC almayınız. **PROZAC'ı bıraktıktan 5 gün içinde tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol açar.**
- Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız PROZAC almayınız.

#### **PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyse, nöbet geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
- Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyse; manik atak geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
- Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antidiyabetik tedavinin dozunu ayarlaması gerekebilir).
- Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir).
- Kalple ilgili sorunlarınız varsa.
- İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız.
- Elektrokonvülsif tedavi görüyorsanız.
- Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar ortaya çıkıyorsa.
- Kanın pıhtılaşmasını etkileyen tıbbi ürünler kullanıyorsanız (bkz. 'Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı').
- Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme, zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, **derhal doktorunuza bildiriniz**, PROZAC kullanımının kesilmesi gerekebilir.
- İntihar düşünceleriniz varsa ya da kendinize zarar vermek istiyorsanız. Depresyonda intihar düşünceleri, kendine zarar verme ve intihar riski (intiharla ilgili olaylar) artar. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hafta bazen daha uzun sürer.

Bu durumda ařağıdaki gibi dūřünebilirsiniz:

- Daha nce intihar ya da kendine zarar verme dūřūncesi varsa
- Gen yetiřkinseniz. Klinik alıřmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiř 24 yařın altındaki psikiyatrik durumu olan yetiřkinlerde intihar davranıřında artma riskini gstermiřtir.

Eęer her an kendine zarar verme ya da intihar etme dūřūnceleriniz varsa **doktorunuzla irtibata geiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.**

Herhangi bir yakınınıza depresyonunuz ya da anksiyete bozukluęunuz olduęunuzu sylemeniz yararlı olabilir. Onlardan bu talimatı okumalarını isteyiniz. Depresyonunuzun ya da anksiyetenizin daha ktūye gittięini ya da davranıřlarındaki deęiřikliklerden endiře duyduklarını size sylemelerini isteyebilirsiniz.

- 18 yařın altındaki hastalar bu sınıftaki ilaları aldıęında intihara teřebbū, intihar dūřūnceleri ve muhalefet (aęırlıklı olarak saldırganlık, karřı gelme ve fke) gibi yan etkilerde artıř riski bulunmaktadır. PROZAC'ın būyūme, ergenlik, ruhsal, duygusal ve davranıř geliřimi ūzerine uzun sūreli gūvenlilik bilgisi sınırlıdır. PROZAC'ın ocuklar ve ergenlerde kullanılması nerilmemektedir.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse lūtfen doktorunuza danıřınız.

### **PROZAC'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

PROZAC'ı tercihinize gre yemekle birlikte ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Bu ilacı kullanırken alkol almaktan kaınmalısınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

řu ana kadar toplanmıř olan bilgiler, ila hamilelik sırasında kullanıldıęında riskin arttıęını gstermemektedir. Bununla birlikte, ila hamilelik sırasında, zellikle de hamilelięin son dneminde ya da doęumdan hemen nce kullanılırken dikkatli olunmalıdır, nkū yeni doęan bebeklerde ařağıdaki etkiler bildirilmiřtir: ařırı hassasiyet, titreme, kas gūsūzlūęū, sūrekli aęlama, emme ya da uyuma gūlūęū ve yeni doęanın direnli pulmoner hipertansiyonu.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Fluoksetin anne sūtūne geer ve bebeklerde yan etkilere neden olabilir. Ancak kesinlikle gerekli olan durumlarda bebeęinizi emzirmelisiniz. Eęer emzirme devam ediyorsa doktorunuz fluoksetin dozunu azaltabilir.

### **Ara ve makine kullanımı**

Bu ila, karar verme yeteneęinizi ya da uyumunuzu etkileyebilir. Doktorunuza ya da eczacınıza danıřmadan ara ya da makine kullanmayınız.

### **PROZAC'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

PROZAC likit sukroz içerir. Eğer doktorunuz tarafından size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenirse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu ürünün tatlandırılmasında kullanılan nane aromasında küçük miktarda (doz başına 100 mg) etanol bulunmaktadır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bu ilaç diğer bazı ilaçların etki gösterme şeklini etkileyebilir (etkileşim). Aşağıdaki ilaçlarla etkileşim meydana gelebilir:

- MAO-inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır). Seçici olmayan MAO-inhibitörleri ve MAO-inhibitörleri tip A (moklobemid) PROZAC ile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar (serotonin sendromu) meydana gelebilir (bkz. "PROZAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ" başlıklı bölüm). MAO-inhibitörleri tip B (selegelin), doktorunuzun sizi yakından takip etmesi şartıyla PROZAC ile birlikte kullanılabilir.
- Lityum, triptofan; bu ilaçlar PROZAC ile birlikte kullanıldığı takdirde serotonin sendromu riski artar. PROZAC lityum ile kombinasyon halinde kullanıldığı takdirde doktorunuz genel sağlık kontrollerinin sıklığını artıracaktır.
- Fenitoin (sara için kullanılır); çünkü PROZAC bu ilacın kandaki düzeylerini etkileyebilir, PROZAC ile birlikte kullanılacaksa doktorunuzun fenitoin tedavisine daha dikkatli başlaması ve genel sağlık kontrolleri yapması gerekebilir.
- Tramadol (ağrı kesici) ya da triptanlar (migren için); hipertansiyon riski artar.
- Flekainid ya da enkainid (kalple ilgili sorunlar için), karbamazepin (sara için), trisiklik antidepresanlar (örneğin imipramin, desipramin ve amitriptilin); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir, PROZAC ile birlikte kullanılıyorsa doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltmaya gerek duyabilir.
- Tamoksifen (göğüs kanseri tedavisi için); çünkü PROZAC bu ilaçların kandaki düzeylerini değiştirebilir. Doktorunuz farklı antidepresan tedavilerini değerlendirmeye gerek duyabilir.
- Varfarin ya da kanı sulandırmak için kullanılan diğer ilaçlar (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan klozapin dahil); PROZAC bu ilaçların kan üzerindeki etkisini değiştirebilir. Siz varfarin kullanırken PROZAC tedavisinin başlatılması ya da durdurulması halinde doktorunuzun bazı testler yapması gerekecektir.
- PROZAC ile tedavi görülürken sarı kantaron (St. John's wort) ile bitkisel tedaviye başlanmamalıdır, çünkü bu yapıldığı takdirde istenmeyen etkilerde artış görülebilir. PROZAC tedavisine başlandığında sarı kantaron (St. John's wort) bitkisi kullanmaktaysanız, bu ilacı kullanmayı kesmeli ve bir sonraki vizitte doktorunuza bildirmelisiniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda (5 hafta öncesine kadar) kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PROZAC nasıl kullanılır?**

PROZAC'ı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

- Depresyon: Önerilen doz günde bir ölçektir (5 ml) (= 20 mg fluoksetin). Tedavi başlatıldıktan sonraki 3-4 hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum 3 ölçeğe (15 ml) (=60 mg fluoksetin) kadar kademeli olarak artırılabilir. En düşük etkili dozu aldığınızdan emin olmak için doz dikkatle artırılmalıdır. Depresyon ilacınızı almaya ilk başladığınızda hemen kendinizi daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu normaldir, çünkü ilk birkaç hafta geçinceye kadar depresif belirtilerde iyileşme meydana gelmeyebilir. Depresyon hastaları en az 6 aylık bir süre boyunca tedavi edilmelidir.
- Bulimia nervosa: Günde üç kez bir ölçek (20 mg fluoksetin ) ya da bir kez üç ölçektir (60 mg fluoksetin).
- Obsesif kompulsif bozukluk (OKB): Önerilen doz günde bir ölçektir (20 mg fluoksetin). Tedavi başlatıldıktan 2 hafta sonra doktorunuz dozunuzu gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum üç ölçeğe (60 mg) kadar kademeli olarak artırılabilir. 10 hafta içinde herhangi bir iyileşme gözlenmezse, PROZAC tedavisi yeniden değerlendirilmelidir.
- Adet öncesi huzursuzluk (pre-menstrüel disforik bozukluk (PMDB)): Adet döngüsü boyunca her gün 20 mg doz ya da aralıklı olarak adet başlangıcından 14 gün önce başlayarak adet ilk gününe kadar ve her döngüde tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

- İlacınızı kutunun içinde bulunan ölçek kaşığı ile belirtilen miktarda kullanınız.
- Kaç ölçek içeceğiniz ve bunları hangi sıklıkta içeceğiniz konusunda her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
- Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla ilaç kullanmayınız.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

PROZAC'ın çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlıysanız, doktorunuz dozu artırırken daha dikkatli olacaktır ve günlük doz genellikle iki ölçeği (40 mg fluoksetin ) aşmamalıdır. Maksimum doz günde 3 ölçektir (60 mg fluoksetin).

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğerle ilgili bir sorunuz varsa ya da PROZAC'ı etkileyebilecek başka bir ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuzun kararı daha düşük bir doz vermek ya da PROZAC'ı iki günde bir kullanmanızı söylemek yönünde olabilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz PROZAC ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

*Eğer PROZAC'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla PROZAC kullandıysanız**

*PROZAC'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Çok fazla ilaç içmişseniz derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz ya da durumu derhal doktorunuza bildirin.

Mümkünse yanınıza PROZAC şişesini de alınız.

Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kusma, nöbetler, kalple ilgili sorunlar (kalp atışlarında düzensizlik ve kalp durması gibi) akciğerle ilgili sorunlar ve ruhsal durumda huzursuzluktan komaya kadar ilerleyen değişiklikler.

### **PROZAC'ı kullanmayı unutursanız**

Bir dozu almayı unuttuysanız endişelenmeyiniz. Bir sonraki dozunuzu bir sonraki gün normal saatinde alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

İlacınızı her gün aynı saatte almanız size her gün ilacınızı düzenli olarak almanız gerektiğini hatırlatmaya yardımcı olacaktır.

### **PROZAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

**Doktorunuz söylemedikçe PROZAC ile tedavinizi kesmeyiniz.** İlacınızı almaya devam etmeniz önemlidir.

- Kendinizi daha iyi hissetmeye başlarsanız bile ilacınızı doktorunuza sormadan bırakmayınız.
- Yeteri kadar ilacınızın olduğundan emin olunuz.

PROZAC kullanmayı bıraktığınızda aşağıdaki etkileri fark edebilirsiniz: Sersemlik, karıncalanma hissi (iğnelenme gibi), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kâbuslar, uyuyamama), huzursuz ya da heyecanlı hissetme, olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük, endişeli hissetme, bulantı/kusma (hasta hissetme ya da hasta olma), aşırı titreme (sarsılma), baş ağrıları.

Çoğu kişiye göre, PROZAC bırakıldığında görülen tüm belirtiler hafiftir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmektedir. Tedaviyi kestiğinizde belirtilerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

PROZAC'ı bırakırken doktorunuz dozunuzu bir ya da iki hafta içinde yavaş yavaş azaltmanıza yardımcı olacaktır. Bu da tedavinin sonlandırılmasında oluşabilecek etkilerin meydana gelme riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

PROZAC'ın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

**Bunlarla ya da başka bir hastalık etkisiyle karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.**

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PROZAC'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, PROZAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ya da intihar gibi düşünceleriniz varsa
- Döküntü fark ederseniz ya da kaşıntı, dudaklarda/dilde şişme veya hırıltı/nefes darlığı gibi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse,
- Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve hareketsiz duramıyormuş ya da oturamıyormuşsunuz gibi geliyorsa, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; PROZAC dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
- Cilt renginiz kırmızıya dönmeye başlarsa ya da çeşitli deri reaksiyonları gelişirse veya cildinizde kabarcıklar ya da soyulma varsa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROZAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Solunum hızının ya da kalp atım hızının artmasıyla birlikte açıklanamayan ateş, terleme, kaslarda sertlik ya da titreme, zihin karışıklığı, aşırı huzursuzluk ya da uyku hali (seyrek olarak) dahil olmak üzere çeşitli belirtiler bir arada ortaya çıkması (serotonin sendromu olarak bilinir)
- Çoğunlukla yaşlılarda ve idrar söktürücü (diüretik) alan (yaşlı) kişilerde güçsüzlük, uyuşukluk ya da zihin karışıklığı
- Uzun süreli ya da ağrılı sertleşme
- Aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk
- Kanama belirtileri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.**

- Ağız kuruluğu

- Aşırı terleme
- Üşüme
- Titreme
- Güneş ışığına karşı hassasiyet
- Kilo kaybı
- İshal ve mide bozukluğu
- Bulantı
- Kusma
- Hazımsızlık
- Yutma güçlüğü
- Boğaz iltihabı
- Diş sıkma
- Tat alma duyusunda değişiklik
- Karaciğer fonksiyonunda anormallik
- Sarılık vakaları
- Serum hastalığı
- Damar iltihabı
- Damar genişlemesi
- Göz bebeklerinin genişlemesi
- Baş ağrısı
- Çarpıntı
- Uyku sorunları ya da olağandışı rüyalar
- Sersemlik
- Tansiyon düşüklüğü
- İştah kaybı
- Yorgunluk
- Anormal mutluluk hissi
- Kontrol edilemeyen hareketler
- Hareket zorluğu
- Vücudun dengesini sağlayamaması
- Havale
- Huzursuzluk
- Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)
- Tipik olmayan saldırgan davranışlar
- Zihin karışıklığı
- Endişe
- Sinirlilik
- Konsantre olamama ya da doğru düşünememe
- Panik ataklar
- İntihar veya kendine zarar verme düşünceleri
- İdrar yapmada güçlük ya da çok sık idrar yapma
- Cinsel performansın kötü olması
- Erkek cinsel organının zamansız sertleşmesi
- Memelerden süt gelmesi
- Boğaz ağrısı
- Nefes kesilmesi
- Akciğerle ilgili sorunlar (seyrek olarak bildirilmiştir)



- Saç dökülmesi
- Esneme
- Bulanık görme
- Açıklanamayan morluklar ya da kanama
- Sıcak basması
- Eklem veya kas ağrısı
- Kanda sodyum düzeylerinin düşük olması
- Çocuklarda burun kanaması
- Çocuklar ve ergenler: PROZAC büyümeyi yavaşlatabilir ya da muhtemelen cinsel olgunlaşmada gecikmeye yol açabilir.

Bu yan etkilerin çoğu tedavi devam ettirildiğinde kaybolmaktadır.

Bunlar PROZAC'ın hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. PROZAC'ın saklanması**

*PROZAC'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Bu ilacı, 15- 25°C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROZAC'ı kullanmayınız.*

**Ruhsat sahibi** : Lilly İlaç Ticaret Limited Şirketi  
Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No:4 Kat:3  
34662 Altunizade – İstanbul  
Tel: 0216 554 00 00  
Faks: 0216 474 71 99

**Üretim yeri** : Patheon France  
40, boulevard de Champaret  
38300 Bourgoin-Jallieu  
Fransa

*Bu kullanma talimatı 13.06.2011 tarihinde onaylanmıştır.*