

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/208/lipanthyl-267-m-30-kapsul>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/C10AB05>

KULLANMA TALİMATI

LIPANTHYL® 267 M Kapsül

Ağızdan alınır

Etkin madde : Her bir kapsül, 267 mg fenofibrat içerir.

Yardımcı maddeler : Sodyum lauril sülfat, laktoz, prejelatinize mısır nişastası, krospovidon, magnezyum stearat. Kapsül jelatinden yapılmış olup titanyum dioksit (E 171), sarı ve kırmızı demiroksit (E 172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. *LIPANTHYL® nedir ve ne için kullanılır ?*
2. *LIPANTHYL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *LIPANTHYL® nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *LIPANTHYL®'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. LIPANTHYL® nedir ve ne için kullanılır ?

LIPANTHYL® portakal ve fildişi renkli kapsüldür. Ambalajında 30 ve 90 kapsül içermektedir.

LIPANTHYL® etkin madde olarak lipidleri düşüren, kolesterolü ve trigliseridi azaltan bir madde olan fenofibrat içermektedir.

Bu ilaç, erişkinlerde kandaki kolesterolün normalden yüksek olduğu (hiperkolesterolemi) ve/veya kandaki yağların (trigliserit) arttığı ancak, uygun ve düzenli takip edilen bir diyetin yetersiz olduğunun anlaşıldığı çeşitli durumlarda, önerilmektedir.

2. LIPANTHYL® i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIPANTHYL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bu ilaç sadece erişkinler içindir, çocuklarda kullanmayınız.

Eğer:

- Karaciğer yetmezliğiniz (karaciğer fonksiyon bozukluğu) varsa,
- Böbrek yetmezliğiniz (böbrek fonksiyon bozukluğu) varsa,
- Fenofibrata veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşırı duyarlı iseniz,
- Fenofibrat veya benzer yapıdaki bir ilaçla, özellikle de bir antienflamatuvar ilaç olan ketoprofen ile tedavi sırasında, bilinen fototoksisite veya bilinen ışık alerjiniz (güneş ışığına veya yapay ultraviyole ışığa maruz kaldığımızda deri reaksiyonları) varsa,
- Safra taşınız varsa,
- Kandaki bir tip yağın yüksek düzeyde olmasına bağlı akut pankreatit (pankreasın karın ağrısına yol açan iltihabı) dışındaki nedenlerden kaynaklanan pankreatit.
- Hamile iseniz veya emziriyorsanız,

LIPANTHYL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Kas ağrıları görülmesi durumunda derhal doktorunuza bildiriniz.
- Tedaviden önce ve tedavinin ilk yılında düzenli olarak (genellikle 3 ayda bir) karaciğer fonksiyon testleri yaptırınız.
- Tedavinizin ilk 3 ayında kanınızdaki kreatinin miktarı takip edilmelidir.
- Bu ilacın bileşiminde laktoz bulunduğu için, eğer galaktozemi, glikoz ve galaktoz emilim bozukluğu veya laktaz adlı enzimin eksikliği (ender görülen bir metabolik hastalık) gibi hastalıklarınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
- Tiroid beziniz az çalışıyorsa (hipotiroidizm) doktorunuza bildiriniz. • Fazla miktarda alkol kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

LIPANTHYL®'in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması

LIPANTHYL® yiyeceklerle birlikte alındığında daha iyi etki gösterdiği için yemeklerle birlikte kullanmanız önemlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç hamilelerde kullanılmaz. Fenofibratın hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz ilacı kullanmayı kesip hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fenofibratın anne sütüne geçişi ile ilgili bilgi yoktur. Bu nedenle bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

LIPANTHYL®'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

LIPANTHYL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bileşiminde laktoz içerdiği için, eğer galaktozemi, glikoz ve galaktoz emilim bozukluğu veya laktaz adlı enzimin eksikliği (ender görülen metabolik hastalıklar) gibi hastalıklarınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İlaçlar arasındaki olası etkileşimlerden kaçınmak için, özellikle kolesterol için fibrat veya statin sınıfı ilaçları; kanın pıhtılaşmasını önleyici ağız yoluyla kullanılan ilaçları, siklosporin adlı ilaç maddesini içeren ilaçları kullanmakta iseniz, doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Başka bir doktora veya hastaneye giderseniz LIPANTHYL® aldığınızı söyleyiniz, çünkü LIPANTHYL® ile birlikte kullanmamanız gereken bazı ilaçlar vardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LIPANTHYL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- LIPANTHYL®'in erişkinler için dozu günde bir defa 200 mg fenofibrat içeren bir kapsüldür. Ancak, doktorunuz kanınızdaki lipidlerin miktarına göre, sizin günde bir adet LIPANTHYL® 267 M kapsül kullanmanızı isteyebilir.
- Lipid bozukluğu uzun süreli bir tedavi gerektirir. Doktorunuz bildirmediği sürece ilacınızı kesmeyiniz.
- Tedaviden önce doktorunuzun önerdiği diyeti LIPANTHYL® ile tedaviniz boyunca uygulamaya devam ediniz.
- Bu ilacın uygun kullanımı için, düzenli olarak tıbbi muayene olmanız esastır.
- *Her durumda doktorunuzun talimatına kesinlikle uyunuz.*

Uygulama yolu ve metodu:

- LIPANTHYL® ağızdan kullanım içindir.
- Mideniz boş iken aldığınız takdirde etkisi daha az olacağı için yiyecekle birlikte yutmanız önemlidir. Kapsülü bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.
- Kapsülleri doktorunuzun reçetelemesine göre, bir öğün arasında, hergün aynı saatte alınız.

Değişik yaş**grupları:****Çocuklarda****kullanımı:**

LIPANTHYL® çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Alışılmış erişkin dozu önerilir.

Özel kullanım**durumları: Böbrek****yetmezliği:**

LIPANTHYL® 267 M Kapsül şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılması gerekir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanımına ilişkin çalışma yapılmamıştır.

Doktorunuz LIPANTHYL® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer LIPANTHYL®'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla LIPANTHYL® kullandıysanız:

LIPANTHYL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını yanlışlıkla kullanmışsanız veya bir çocuğun yuttuğunu düşünüyorsanız derhal doktor veya eczacınıza danışınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

LIPANTHYL® ile aşırı doz alımı bildirilmemiştir. Özel bir antidot bilinmemektedir.

LIPANTHYL®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LIPANTHYL® almayı unutursanız telaş etmeyiniz. Bir sonraki öğününüzde ilacınızı alıp tedavinize ertesi gün doktorunuz tarafından başlangıçta önerildiği şekilde devam ediniz.

LIPANTHYL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda, LIPANTHYL® ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LIPANTHYL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. LIPANTHYL®'i alırken pek çok kişide hiçbir yan etki görülmemektedir. Yan etkiler birkaç gün içinde geçmez veya kendinizi kötü hissederseniz bir sonraki dozu almadan önce doktorunuza danışınız.

Aşağıdakilerden biri olursa, LIPANTHYL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kas ağrıları,
- Kas kasılmaları
- Zayıflık,
- Rabdomiyoliz (kas yıkımı)

Kaslarla ilgili bu problemler seyrek durumlarda ciddi olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Mide veya bağırsak bozuklukları (karın ağrıları, bulantı, kusma, ishal ve gaz),
- Alerjik tipte deri reaksiyonları (döküntüler, kaşıntı) veya vücudun güneş ışığına veya ultraviyole lambası ışığına maruz kalan bölgelerinde ışığa duyarlılık reaksiyonları (güneş ışığına veya yapay ultraviyole ışığına maruz kalma durumunda).
- Baş ağrısı, baş dönmesi
- Karaciğer enzimlerinin kandaki miktarlarında geçici yükselme, sarılık,
- Safra taşları,
- Belirtileri hafif sarılık (derinin ve gözün beyaz kısmının sararması), karın ağrısı ve kaşıntı olan karaciğer iltihabı (hepatit),
- Cinsel güçsüzlük,
- Pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı),
- Saç dökülmesi,
- Akciğer dokuları arasında bozukluklar,
- Kanda kreatinin ve üre miktarlarında artış; hemoglobin miktarında ve beyaz kan hücrelerinde azalma,
- Tromboembolizm: Pulmoner embolizm (akciğerde kan pıhtısından kaynaklanan göğüs ağrısı ve soluk alamama), derin ven trombozu (bacaklarda kan pıhtısından kaynaklanan kızarıklık veya şişme)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LIPANTHYL®'in saklanması

LIPANTHYL®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajı içinde, kuru bir yerde ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız.

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra LIPANTHYL®'i kullanmayınız.
Üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz LIPANTHYL®'i
kullanmayınız.*

Ruhsat Sahibi:

Abbott Laboratuvarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekinciler Cad., Hedef Plaza, No: 3,
Kavacık - Beykoz, 34810 İstanbul

Üretim yeri:

RECIPHARM FONTAINE

Rue des Prés-Potets

21121 FONTAINE LES DIJON - FRANSA

Bu kullanma talimatı 31.05.2011 tarihinde onaylanmıştır.