

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/4/dolgit-krem-yuzde-5-50-gr-krem>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/M02AA13>

## KULLANMA TALİMATI

### **DOLGİT® % 5 Krem**

**Cilt üzerine uygulanır.**

- **Etkin madde:** Her 100 gram krem etkin madde olarak 5 gram ibuprofen içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Orta zincirli dallanmış trigliseridler, gliserol monostearat, polioksietilen-30-stearat, polioksietilen-100-stearat, aluminyum stearat, 1,2-propandiol, para-hidroksibenzoik asit metilesteri sodyum tuzu, ksantan zamkı, lavanta esansı, neroli esansı, deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **DOLGİT® nedir ve ne için kullanılır ?**
2. **DOLGİT® 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DOLGİT® nasıl kullanılır ?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DOLGİT® 'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. DOLGİT® nedir ve ne için kullanılır ?

- DOLGİT® 50 gram krem içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.
- DOLGİT® ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.
- DOLGİT® adale romatizması, ağırlı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun (eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

## 2. DOLGİT®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### DOLGİT®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- İbuprofene veya DOLGİT® içeriğindeki propilen glikol ve/veya para-hidroksibenzoik asit metil esterine karşı aşırı duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizmal ilaçlara karşı alerjiniz var ise
- Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya ekzemanız var ise
- Gebeliğinizin son üç aylık döneminde iseniz

DOLGİT® 'i kullanmayınız.

### DOLGİT®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

DOLGİT®'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer:

- 14 yaşından küçük iseniz
- Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız (kronik tıkaçıcı akciğer hastalığı gibi) var ise
- Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise
- Derinizde kaşınma, döküntü var ise

DOLGİT® ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.

Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

**DOLGİT®'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

DOLGİT® haricen kullanılır. Bu sebeple DOLGİT®'i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

**Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileliđinizin esnasında gerekli olmadığı srece DOLGİT® kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

**Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Sadece ibuprofenin kk miktarları ve vcutta yıkım rnleri anne stne karıřır. Bebek zerinde řimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediđi iin, kısa sreli tedavilerde anne stnn kesilmesine gerek yoktur. Ancak gnlk doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluđunda uygulanan krem miktarı ařılmamalıdır ve uzun sreli tedavilerde anne stnn erken kesilmesi dřnlmelidir.

Bebeklerin emzirme sırasında bu ilacı vcutlarına almamaları iin, emziren anneler bu ilacı meme zerine srmemelidir.

**Ara ve makine kullanımı**

DOLGİT® in ara ve makine kullanma yeteneđiniz zerine herhangi bir etkisi sz konusu deđildir.

**DOLGİT®'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

DOLGİT® in ieriđinde bulunan propilen glikol ciltte tahriře sebep olabilir. Para-hidroksi benzoik asit metilesteri sodyum tuzu ise deriyi, gz ve ađız burun i yzeyini hafif derecede tahriř edebilir.

**Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

DOLGİT®'in řu ana kadar diđer ilalarla karřılıklı etkileřimine rastlanmamıřtır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DOLGİT® nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- Özel bir tavsiyede bulunulmamışsa, DOLGİT® günde 3-4 defa, gereksinime göre daha sık, 4-10 cm uzunluğunda derinize sürüp ovunuz.
- Tedavinizin süresine doktorunuz karar verir. Genelde, 2-3 hafta boyunca hergün DOLGİT® sürülmesi yeterli olur.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!

DOLGİT®'i cildinize sürünüz ve hafifçe ovunuz. Büyük bölgesel kan birikmesi (hematom) ve şişmelerde tedavinin başlangıcında sıkı bir bandaj kullanılması faydalı olabilir.

Bu sayede kremin deriden daha fazla geçmesi sağlanabilir.

#### **Çocuklarda kullanım:**

DOLGİT®'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

#### **Yaşlılarda kullanım:**

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

#### **Karaciğer/Böbrek yetmezliği :**

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur. Deriden uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, ibuprofen metabolizmasının böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçların tedavisinde olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğu gözükülebilir.

#### **Kullanmanız gerekenden fazla DOLGİT® kullandıysanız:**

*DOLGİT®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, kremi arındırıp su ile yıkayınız. Fazla miktarda uyguladığınızda veya kazara aldığınızı düşündüğünüzde doktorunuz ile temasa geçiniz.

Özel bir panzehiri yoktur.

#### **DOLGİT® 'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.*

*Eğer DOLGİT® 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DOLGİT®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, DOLGİT®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük
- Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOLGİT®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,
- İlacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı
- İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### 5. DOLGİT® 'in saklanması

*DOLGİT® 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

Bu ilacı, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DOLGİT® 'i kullanmayınız

#### ***Ruhsat Sahibi:***

DOLORGIET Arzneimittel GmbH ve Co. KG

53754, St Augustin / Bonn - ALMANYA Lisansı ile

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Necipbey Cad. No: 88, 55020 – Samsun

Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

#### ***Üretici:***

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Necipbey Cad. No: 88, 55020 – Samsun

Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

*Bu kullanma talimatı en son 07/04/2011'de onaylanmıştır.*