

## KULLANMA TALİMATI

### LAVENİL 30 mg/5 ml şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 5 ml’de 30 mg levodropropizin bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve aroması, kakao aroması, etanol, sitrik asit, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **LAVENİL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **LAVENİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **LAVENİL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **LAVENİL’in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. LAVENİL nedir ve niçin kullanılır?

- LAVENİL'in etkin maddesi levodropropizin, öksürük kesici özelliindedir.
- LAVENİL, 150 ml'lik cam şişede, 5 mL'lik işaretli ölçeđi ile birlikte sunulur.

Berrak, renksiz çözeltili görünümündedir.

- LAVENİL, çeşitli nedenlere bađlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

## 2. LAVENİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### LAVENİL'i aşıđıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Levodropropizine veya LAVENİL'in bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
- Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, ağır karaciđer bozukluđunuz varsa, balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız LAVENİL'i kullanmayınız.

### LAVENİL'i aşıđıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Ciddi böbrek yetmezliđiniz varsa hekiminize danıřmadan LAVENİL'i kullanmayınız.
- Diyabetiniz (şeker hastalıđınız) varsa, hekiminize danıřmadan LAVENİL'i kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### LAVENİL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

LAVENİL'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduđu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

LAVENİL bebeđinize zarar verebilir, kullanmayınız. Ancak, çok gerekli olduđu durumlarda doktorunuz yarar/zarar oranına göre karar verecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### Emzirme

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

LAVENİL'in anne sütüne geip gemediđi bilinmediđinden, zorunlu olmadıka emzirirken kullanmayınız.

### Ara ve makine kullanımı

ok seyrek olarak yorgunluk ve halsizlik bildirildiđinden, ara kullanma ve herhangi bir makine iřletilmesi sırasında ok dikkatli olunmalıdır.

### LAVENİL'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAVENİL'in her 5 mL'si 2.5 g sukroz ierir. Bu nedenle, eđer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlıđınız (intoleransınız) olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

LAVENİL'in içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben muhtemelen gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi üründe hacmin % 6.25'i kadar etanol (alkol) vardır; (her 5 mL' de 250 mg).

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi (sara hastalığı) gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. LAVENİL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

LAVENİL'in besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

LAVENİL erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır. İlaç 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

#### **• Uygulama yolu ve metodu:**

LAVENİL sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

#### **• Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

- 2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
- 3 eşit doza bölünerek en az 6'şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.
- 10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar)
- 20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)
- 30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 ml (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

**Yaşlılarda kullanımı:** LAVENİL dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

#### **• Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:** Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

*Eğer LAVENİL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla LAVENİL kullandıysanız**

*LAVENİL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **LAVENİL'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **LAVENİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler** Bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, LAVENİL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

#### **Aşağıdakilerden biri olursa, LAVENİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAVENİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

#### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Bulantı-kusma
- Hazımsızlık
- Midede yanma hissi
- İshal
- Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Çarpıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı).

Bunlar LAVENİL'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. LAVENİL'in saklanması**

*LAVENİL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 C'nin altında oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra LAVENİL'i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAVENİL'i kullanmayınız.*

#### ***Ruhsat sahibi:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
34398 Maslak-İstanbul

#### ***Üretim yeri:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

*Bu kullanma talimatı 10.03.2011 tarihinde onaylanmıştır.*