

KULLANMA TALİMATI

FUCİDİN H krem **Cilt üzerine uygulanır.**

Etkin Madde: 1 g krem 20 mg fusidik asit ve 10 mg hidrokortizon asetat içerir.

Yardımcı Maddeler: Butil hidroksianisol (E320), setil alkol, gliserol %85, sıvı parafin, polisorbitat 60, potasyum sorbat, beyaz yumuşak parafin, hidroklorik asit 3M, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında

1. ***FUCİDİN H nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***FUCİDİN H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***FUCİDİN H nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***FUCİDİN H'nin saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. FUCİDİN H nedir ve ne için kullanılır ?

FUCİDİN H 30 g'lık tüp içeren kutularda sunulur.

FUCİDİN H içeriğindeki etken maddelerden biri (fusidik asit) bakteri kaynaklı enfeksiyonları önleyici ve diğer etkin madde (hidrokortizon asetat) iltihap ve kaşıntı giderici özelliğindedir.

FUCİDİN H, enfeksiyonun eşlik ettiği veya enfeksiyon riski taşıyan kontakt dermatit veya atopik dermatit dahil olmak üzere dermatit (genellikle enflamasyon, kızarıklık, kabuklanmış yara ve kaşıntı ile seyreden ve alerjik kaynaklı da olabilen ekzema tipi deri hastalıkları) tedavisinde kullanılır.

2. FUCİDİN H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCİDİN H'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- cildinizde virus, bakteri veya mantar kökenli primer enfeksiyon var ise kullanmayınız.

FUCİDİN H'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Açık yaralara ve mukozalara uygulamayınız.
- Etkin maddelerden hidrokortizon asetat göz tansiyonuna yol açabileceğinden, göze yakın bölgelerde kullanırken dikkatli olunuz.
- Antibiyotiğe karşı direnç gelişebileceğinden uzun süreli kullanmayınız.
- Ülser, atrofik cilt hastalığı, tüberküloz, sifiliz, perioral dermatit veya rozase (yüzde şiddetli kızarıklık) varsa kullanmayınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FUCİDİN H'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecekler ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte kullanımına, risk/ yarar oranı değerlendirilerek doktor tarafından karar verilmelidir.

Kortikoid içeriği nedeniyle hamilelikte fazla miktarda ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanımına, risk/ yarar oranı değerlendirilerek doktor tarafından karar verilmelidir.

Kortikoid içeriği nedeniyle emzirme döneminde fazla miktarda ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

FUCİDİN emzirmeden hemen önce göğüslere uygulanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

FUCİDİN H'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FUCİDİN H, butil hidroksianisol (E320) ve setil alkol içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

İçeriğinde bulunan gliserol % 85 ve potasyum sorbat için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUCİDİN ile herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Ancak, ilacın içindeki etken maddelerden biri enfeksiyonu maskeleyerek gizli enfeksiyon yayılımına yol açabileceğinden, herhangi bir düzelme olmaz ise, 7 günden uzun süre kullanılmamalıdır

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUCİDİN H nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar :

2 hafta kadar günde 3 defa uygulanır.

Kapalı lezyonlarda daha az sıklıkta uygulama yeterli olabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Cilt üzerine sürülerek uygulanır.

FUCİDİN H'in yüzde ve ellerde, kasık ve koltukaltı gibi bölgelerde kullanımı da kozmetik açıdan uyumludur.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı : Çocuklarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı : Yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği : FUCİDİN H kremin kullanımına ilişkin olarak, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer FUCİDİN H'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDİN H kullandıysanız

FUCİDİN H'in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCİDİN H'ı, kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

FUCİDİN H ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi, FUCİDİN H'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDİN H'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
- Deride kızarıklık, kaşıntı, döküntülerin ortaya çıkması,alerjik dermatit, depigmentasyon

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDİN H'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

FUCİDİN H kullanımı sırasında beklenmeyen bazı yan etkiler görürseniz doktorunuza başvurunuz.

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

- Hafif batma hissi
- İritasyon

'Bunlar FUCİDİN H'in hafif yan etkileridir.'

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FUCİDİN H'in saklanması

FUCİDİN H'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİDİN H'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Leo Pharmaceutical Products
Ballerup/Danimarka

Bu kullanma talimatı 22.02.2011 tarihinde onaylanmıştır.