

KULLANMA TALİMATI

LACRYVISC® Steril Oftalmik Jel, 10 g

Göze uygulanır.

- *Etkin madde:* 10 g'da 30 mg Karbomer
- *Yardımcı maddeler:* Mannitol, tiyomersal, sodyum hidroksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?*
2. *LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *LACRYVISC nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *LACRYVISC'in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. LACRYVISC nedir ve ne için kullanılır?

LACRYVISC, göz kuruluğu vakalarında göz yüzeyinin eksik veya bozuk yapıda ıslatılmasından kaynaklanan durumlarda gözyaşının yerine geçer.

LACRYVISC, suni gözyaşları olarak adlandırılan bir grup ilaçtan biridir.

LACRYVISC, 10 g'lık lamine bir tüpte sunulan, hafif şeffaf viskoz bir jeldir.

2. LACRYVISC'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LACRYVISC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise
- Kontakt lens gözünüzde iken

LACRYVISC'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Ürünün içeriğinde bulunan tiyomersal isimli madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- Başka ilaçlar da kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

LACRYVISC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LACRYVISC göze sürülerek kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiđi şekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

LACRYVISC kullandıktan hemen sonra jel gözünüzün yüzeyi üzerinde tamamen yayılana kadar görüşünüzde bulanıklaşma oluşabilir. Bu bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

LACRYVISC'in içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

LACRYVISC'in içeriğindeki bir madde (tiyomersal) alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eđer ilave göz ilacı kullanacaksanız, uygulamalar arasında 10 ila 15 dakikalık bir ara olmalıdır.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LACRYVISC nasıl kullanılır?



▪ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:

LACRYVISC'i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediđi gibi kullanınız. Emin deđilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Genellikle günde dört kez veya doktorun önerdiđi kadar bir miktar jel, hasta göz(ler)e uygulanır.

LACRYVISC'i yalnızca gözlerinize kullanınız.

▪ **Uygulama yolu ve metodu:**



1. LACRYVISC tüpünü ve bir ayna alınız.
2. Ellerinizi yıkayınız.
3. Tüpün kapağını açınız.
4. Tüpü baş ve işaret parmağınızın arasında tutunuz.
5. Başınızı arkaya eğiniz. Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz arasında bir “kese” oluşuncaya kadar aşağı doğru çekiniz. Pomad buraya sürülecektir.
6. Tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımı olacaksa aynayı kullanınız.
7. Tüpün ağzını gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Pomada mikrop bulaşabilir.
8. Pomad şeridini çıkarmak için tüpe yavaşça bastırınız.
9. LACRYVISC’i kullandıktan sonra göz kapağınızı bırakınız ve pomadın gözün tüm yüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi yavaşça kapatınız; bu LACRYVISC’in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.
10. Eğer pomadı iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.
11. Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Eğer jeli gözünüze süremediyseniz tekrar deneyiniz.

▪ **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda kullanımı: Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veri yetersizliği nedeniyle kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

▪ **Özel kullanım durumları:**

Özel kullanımı yoktur.

Eğer LACRYVISC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACRYVISC kullandıysanız:

LACRYVISC, ihtiyaç oldukça sıkça kullanılabilir, bu nedenle gözlere uygulandığı sürece doz aşımı mümkün değildir. Tüm tüpün yutulması durumunda bile herhangi bir istenmeyen etki görülmecektir.

LACRYVISC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LACRYVISC'i kullanmayı unutursanız:

LACRYVISC ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Kullanabildiğiniz kadar kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LACRYVISC'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan LACRYVISC kullanımını kesmeyiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Alerjik reaksiyonlar

Bunlar LACRYVISC'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LACRYVISC'in saklanması

LACRYVISC'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. *Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACRYVISC'i kullanmayınız. Tüpü açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.*

Açıldığı tarih:

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Tüpün kapağını sıkıca kapatınız.

Tüp ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805

Beykoz / İSTANBUL

Üretici: s.a. ALCON Couvreur n.v.

Rijksweg 14 2870 Puurs, Belçika

Bu kullanma talimatı 22.02.2011 tarihinde onaylanmıştır.

