

KULLANMA TALİMATI

®OFTALAR Steril Göz Damlası, 5ml

Göze damlatılarak uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 mg/ml Pranoprofen
- **Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum Klorür, Borik Asit, Polisorbitat 80, Sodyum Tetraborat.10 H₂O, EDTA Sodyum Tuzu, Saf Su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun üzerinde yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **®OFTALAR nedir ve ne için kullanılır?**
2. **®OFTALAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?**
3. **®OFTALAR nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **®OFTALAR'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. OFTALAR nedir ve ne için kullanılır?

Farmakoterapötik grup: Non-steroidal antiinflamatuvar (iltihabı önleyici).

5 ml oftalmik (göze uygulamak için) çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. Antiinflamatuvar amaçlarla etkin madde (pranoprofen) içerir.

OFTALAR, gözün ön bölümüne ait iltihaplı durumların tedavisinde (blefarit, konjunktivit, blefarokonjunktivit, anterior uveit, katarakt cerrahisine bağlı olarak görülen oküler inflamasyon) veya göz ameliyatı sonrası tedavide kullanılmaktadır.

2. OFTALAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

OFTALAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- Eğer pranoprofene veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz var ise.

OFTALAR'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Kullanım için özel tedbir gerekmez. Ürün benzalkonyum klorür içerdiğinden dolayı kontakt lens kullanan hastalar lenslerini çıkardıktan sonra solüsyonu damlatmalı ve geri takmak için en az 10-15 dakika beklemelidirler.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OFTALAR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

OFTALAR göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiđi şekilde kullanıldıđı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OFTALAR sadece, kullanılmasının doğru ve hekim kontrolü altında olduđu durumlarda hamilelik esnasında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OFTALAR sadece, kullanılmasının doğru ve hekim kontrolü altında olduđu durumlarda emzirme esnasında kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Bu preparatla tedavinin araba sürme ve makine kullanılmasına etkisi yoktur. Kişinin patoloji durumuna bađlı olarak bazı sınırlamalar olabilir.

OFTALAR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Ürün benzalkonyum klorür içerdiğinden dolayı kontakt lens kullanan hastalar lenslerini çıkardıktan sonra solüsyonu damlatmalı ve geri takmak için en az 5 dakika beklemelidirler.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka bir göz damlası ile eşzamanlı olarak kullanılacaksa, iki uygulama arasında en az 5 dakika beklenmelidir.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OFTALAR nasıl kullanılır?

OFTALAR'ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Başka bir kullanılış şekli önerilmedikçe, her 6 saatte bir hastalıklı göz(ler)e 2 damla damlatılır. Tedavi süresi hekim tarafından düzenlenmelidir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Baş arkaya doğru eğilir. Alt göz kapağı ayrılarak yukarı doğru bakılır ve konjunktiva kesesine (göz ve göz kapağı arasındaki boşluk) damlatılır.

Kullanım ile İlgili Tavsiyeler:

- Bu ürün tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
 - Ürünün uygulaması sırasında en yüksek hijyen koşullarına dikkat edilmelidir: ellerinizi yıkayınız ve damlalık ucunun hiçbir yere (göz dahil) temas etmemesine dikkat ediniz.
 - Her bir uygulamadan sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 - Tedavinin tamamlanmasının ardından kullanılmayan ürünü atınız.
 - Şişe açıldıktan sonra bir ay içinde kullanılmalıdır.
- **Değişik yaş grupları:**
 - **Çocuklarda kullanımı:** Özel bir kullanım şekli bulunmamaktadır. 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 - **Yaşlılarda kullanımı:** Özel bir kullanım şekli bulunmamaktadır.
 - **Özel kullanım durumları:** Özel kullanımı yoktur.

Eğer OFTALAR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OFTALAR kullandıysanız:

Gözlerinizi ılık su ile yıkayınız. Topikal olarak kullanılan bu preparatın özelliklerinden dolayı, tavsiye edilen dozda ürünün kullanılması ile toksik etki beklenmez. Aşırı doz veya kaza ile yutma sonucu hekime başvurulmalıdır.

OFTALAR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OFTALAR'ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuzu hatırladığınız anda tavsiye edilen dozu hemen alınız ve olağan kullanımınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu durumda ne yapacağınızı doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OFTALAR'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan OFTALAR kullanımını kesmeyiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Göz bozuklukları:

Yaygın olmayan (her 1000 kişide 1 ila 10 kişiyi etkileyebilir):
gözde kızarma, göz kaşıntısı, gözde tahriş, gözyaşı artışı

Bunlar OFTALAR'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. OFTALAR'ın saklanması

OFTALAR'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

25°C'nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Işıktan koruyunuz.

Açıldıktan 1 ay sonra atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. *Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OFTALAR'ı kullanmayınız.*

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Merkezi, No: 12 C-Blok K:5 Kavacık
34805 Beykoz / İSTANBUL
Üretici: Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Camil Fabra, 58 08320 El Masnou Barselona / İSPANYA