

## KULLANMA TALİMATI

### WİNCEF 200 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

• **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet 200 mg seftibutene eş değer miktarda 217,50 mg seftibuten dihidrat içermektedir.

• **Yardımcı madde (ler):**

Yardımcı madde olarak laktoz DC, disodyum hidrojen fosfat, sodyum bikarbonat, Polivinilpirolidon, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat ve titanyum dioksit (E 171) bulunmaktadır.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **WİNCEF nedir ve ne için kullanılır?**
2. **WİNCEF'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **WİNCEF nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **WİNCEF'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. WİNCEF nedir ve ne için kullanılır?**

WİNCEF 200 mg film kaplı tablet sefalosporin grubundan bir antibiyotik olan seftibuten içermektedir.

WİNCEF 200 mg film kaplı tablet bakterilerin neden olduğu aşağıdaki farklı tipte enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Alt solunum yolu enfeksiyonları (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi)
- Üst solunum yolu enfeksiyonları [Orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı, farenjit (yutak iltihabı)]

## **2. WİNCEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **WİNCEF ‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Seftibuten veya WİNCEF 200 mg film kaplı tablet içinde yer alan herhangi bir diğer maddeye karşı alerjiniz varsa.

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz WİNCEF ‘i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

### **WİNCEF’i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

WİNCEF tedavisi uygulanmadan önce, WİNCEF’e, sefalosporinlere, penisilinlere ve diğer ilaçlara karşı alerjiniz olup olmadığı belirlenmelidir.

Beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık olduğu kesinlikle kanıtlandığından ve penisiline duyarlı hastaların %10’unda bu durum görülebildiğinden penisiline duyarlı kişilere dikkatle uygulanmalıdır. Eğer WİNCEF’e karşı alerjik reaksiyon gelişirse, ilaç kullanımı derhal bırakılmalıdır. Ciddi alerjik reaksiyonlarda acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar. Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluğunuz varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer:

- Kalın bağırsak iltihabı (Kolit) geçirdiyse
- Kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
- Böbrek problemlerinizi varsa.

WİNCEF’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **WİNCEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

WİNCEF 200 mg film kaplı tableti yemeklerden en az iki saat önce veya en az bir saat sonra alabilirsiniz.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bu ilacın bebek üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

### **WİNCEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

WİNCEF 200 mg film kaplı tablet her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

WİNCEF 200 film kaplı tabletin her dozunda 74,90 mg laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

- Mide asidini düşüren bir ilaçlar,
- Doğum kontrol hapları,
- Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),
- Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),

kullanıyorsanız WİNCEF 200 mg film kaplı tableti kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. WİNCEF nasıl kullanılır?**

**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

**Uygulama yolu ve metodu:**

- Bu ilacı bir bardak su ile birlikte ağızdan alınız

**Yetişkinler:**

Günde bir kez iki WİNCEF 200 mg film kaplı tablet oral yolla alınır. Gerektiğinde doktorunuz farklı bir dozda kullanmanızı söyleyebilir.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Seftibutenin altı (6) aylıktan küçük bebeklerde kullanımına ilişkin hiçbir veri olmadığından, bu yaş grubunda WİNCEF 200 mg film kaplı tablet kullanımı önerilmemektedir.

6 ay-12 yaş arası çocuklarda günde bir kere 9 mg/kg dozda verilmelidir. 45 kg'ın üstünde çocuklara günde bir kez iki WİNCEF 200 mg film kaplı tablet verilmelidir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlı hastalar için yetişkinlere uygulanan dozlar uygulanabilir. Bununla birlikte bu hastalar özellikle de böbrek fonksiyonları açısından yakından takip edilecek ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılacaktır.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:**

Böbrek probleminiz varsa doktorunuz bazı testler uygulayacak ve gerekirse WİNCEF'in dozunu düşürecektir.

**Karaciğer yetmezliği:**

Özel kullanımı yoktur.

*Eğer WİNCEF'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla WİNCEF kullandıysanız:**

*WİNCEF'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**WİNCEF'i kullanmayı unutursanız:**

İlacı almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz alınız eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa bekleyiniz bir sonraki dozunuzun zamanında alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**WİNCEF ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Eğer, WİNCEF'i kesmek isterseniz, doktorunuzla konuşunuz. WİNCEF'i almayı bırakırsanız enfeksiyon tekrarlayabilir veya kötüleşebilir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, WİNCEF'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, WİNCEF'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Şiddetli alerjik reaksiyon. Belirtiler arasında döküntü, eklem ağrısı yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) yer alır.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Sulu veya kanlı ishal
- Ateş, titreme, grip belirtileri

- Olađan dıřı kanama
- Kanlı idrar
- Nöbet (Havale)
- Cilt renginin soluklařması veya sararması, koyu renkli idrar, ateř, havale veya halsizlik
- Sarılık (Deri ve gözlerin sararması)
- Ateř, řiř bezler, döküntü veya kařıntı, eklem ağrısı veya genel olarak hasta gibi hissetme
- Derinin su toplaması, soyulması ve kırmızı deri döküntüleriyle birlikte ateř, bođaz ağrısı ve bař ağrısı
- Çok susama, iřtah kaybı, řiřme, kilo alımı, nefessiz kalma, normalden az idrara çıkma veya hiç idrara çıkamama.

**Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Bulantı, kusma, karın ağrısı, geđirme, kabızlık, hafif ishal
- Kas katılıđı
- Uyuřma veya karıncalanma
- Bař ağrısı, bař dönmesi, bayılma hissi, yorgunluk
- Ağz kuruluđu
- Ağzda beyaz yama veya yara
- Ağzda tuhaf tat
- Burun tıkanıklıđı, gürültülü nefes alma
- Uyku problemleri
- Hafif kařıntı veya deri döküntüsü
- Kadın cinsel organında (vajina) kařıntı veya akıntı

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

Eđer ilaca kötü tepki verdiđinizi düşünüyörsanız veya ilaç kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yařıyorsanız bu durumu doktorunuz veya eczacınızla konuřunuz.

## **5. WINCEF'in saklanması**

*WINCEF'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra WINCEF'i kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, WINCEF'i kullanmayınız.

***Ruhsat sahibi :*** Celtis İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Tozkoparan Mahallesi General  
Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi  
Bağımsız Bölüm No:2/6 Güngören/İSTANBUL  
Telefon: 0 212 481 40 98  
Faks: 0 212 481 40 98  
e-mail: [info@celtilac.com.tr](mailto:info@celtilac.com.tr)

***Üretim Yeri :*** Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı 27.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.*