

Fiyat ve Detaylar: <https://www.ilacprospektusu.com/ilac/216/refresh-tek-dozluk-goz-damlasi-30-flakon>

ATC Kodu: <https://www.ilacprospektusu.com/ara/ilac/atc/S01XA20>

## KULLANMA TALİMATI

**REFRESH tek dozluk göz damlası**

**Göze damlatılır.**

**Etkin Madde:** 0.4 ml'de 5.60 mg. polivinil alkol; 2.40 mg. povidon içerir.

**Yardımcı Maddeler:** Sodyum klorür ve sodyum hidroksit (veya hidroklorik asit).

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **REFRESH nedir ve ne için kullanılır?**
2. **REFRESH'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **REFRESH nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **REFRESH'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. REFRESH nedir ve ne için kullanılır ?**

REFRESH, berrak ve renksiz (veya hafif sarı renkli) bir çözelti olup, tek dozluk flakonlara doldurulmuştur. REFRESH, 30 adet tek dozluk flakon içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

REFRESH'in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır. Göz yüzeyindeki gözyaşı hacmini artırır, gözyaşı filmi düzenler.

Bu amaçla, REFRESH

- eksik veya yapıcı bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı olarak göz yüzeyinin nemlendirilmesinin bozulduğu; göz kuruluğu gibi durumlarda kullanılır.

## **2. REFRESH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **REFRESH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

### **REFRESH’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer gözde ağrı hissi, görmede değişiklik, gözde kızarıklık ve tahriş devam ederse veya kötüye giderek durum 72 saatten daha uzun süre inatla devam ederse ilacı kullanmayı bırakarak bir doktora danışınız.

Eğer ilacın rengi değişir veya bulanıklaşırsa kullanılmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **REFRESH’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

REFRESH’in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

### **Araç ve makine kullanımı**

Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, REFRESH damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

### **REFRESH’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Özel uyarı gerektiren herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip bir madde içermemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız, her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz. *Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*


### 3. REFRESH nasıl kullanılır ?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :**


Rahatsız olan göze ve ihtiyaca göre göze 1 veya 2 damla kullanılır.

Mikropların bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiç bir yere deđdirmeyiniz.


- **Uygulama yolu ve metodu:**




1. Bir adet tek doz flakonunu yerinden ayırın.



2. Üstteki kapakçığı çekerek flakonun açın..



3. Yukarı doğru bakarken, alt göz kapađınızı hafifçe ařađı doğru çekerek, göz damlanızı damlatın.



4. Kullandıktan sonra, flakonun atın.

- **Deđişik yař grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

**Yařlılarda kullanımı:**

Yařlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

- **Özel kullanım durumları :**

**Böbrek/Karaciđer yetmezliđi :**

Böbrek/Karaciđer yetmezliđi ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

*Eđer REFRESH'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

## **Kullanmanız gerekenden daha fazla REFRESH kullandıysanız**

*REFRESH'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

## **REFRESH'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **REFRESH ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

REFRESH ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

## **4. Olası yan etkiler nelerdir ?**

Tüm ilaçlar gibi REFRESH'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, REFRESH'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REFRESH'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Gözde tahriş (kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma vb.) belirtileri.

Bunlar REFRESH'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. REFRESH'in saklanması**

*REFRESH'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

15°C – 25°C'nin arasında, oda sıcaklığında saklayınız.

Her kullanımdan sonra kalan kısım atılmalıdır.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra REFRESH'i kullanmayınız.*

***Ruhsat sahibi:***

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.  
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:4  
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

***Üretici:***

Allergan Pharmaceuticals Ireland  
Westport/İrlanda

*Bu kullanma talimatı 28.12.2009 tarihinde onaylanmıştır.*