

KULLANMA TALİMATI

CEPHİX 200 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her film kaplı tablet 200 mg sefiksim eşdeğer 223.82 mg sefiksim trihidrat içermektedir.
- **Yardımcı madde:** Dibazik kalsiyum fosfat, hidroksipropil metil selüloz, vazelin likit, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, sodyum lauril sülfat, hidroksipropil metil selüloz, propilen glikol, metil hidroksi benzoat, propil hidroksi benzoat ve opaspray m-1-7120, su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. CEPHİX nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. CEPHİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. CEPHİX nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. CEPHİX'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. CEPHİX nedir ve ne için kullanılır?

200 mg sefiksim içeren CEPHİX film kaplı tabletler, PVC folyo / alu blister ambalajlarda ve kullanma talimatının da içerisinde yer aldığı karton kutuda takdim edilmektedir.

Sefiksim, sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri öldürmek için kullanılmaktadır. CEPHİX, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

- Üst solunum yolları enfeksiyonları: Orta kulak iltihabı (otitis media), boğaz enfeksiyonu (farenjit), bademcik iltihabı (tonsilit), gırtlak iltihabı (larenjit) ve diğer antibiyotiklere dirençli olduğu şüpheli veya bilinen diğer organizmaların neden olduğu üst solunum yolları enfeksiyonları.
- Alt solunum yolları enfeksiyonu: Soluk borusu ve bronşların iltihaplanması (bronşit), bronşsal tüplerde meydana gelen iltihaplanma (bronşiolit), zatürree (pnömoni).
- İdrar yolları enfeksiyonu: Mesane iltihabı (sistit), mesane ve üretra iltihabı (sisto-üretit), böbrek iltihapları(piyelonefrit), belsoğukluğu (gonore).

2. CEPHİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEPHİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Sefalosporin türü antibiyotiklere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,

CEPHİX'i kullanmayınız.

CEPHİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

- İleri derece böbrek yetmezliğiniz var ise,
- Emziriyorsanız,
- Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı düşünüyorsanız,
- Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaç (Antikoagülasyon) tedavisi görüyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEPHİX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hayvanlarda yapılan alıřmalar, gebelik, bebeđin anne karnında geliřimi, dođum ya da dođum sonrası geliřimi ile ilgili olarak dođrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduđunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CEPHİX'in anne sütünė getiđi bilindiđinden, emzirme döneminde bebeđe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

CEPHİX'in ara ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

CEPHİX' in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEPHİX' in her tabletinde 4.5 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karşı dayanıksızlıđınız (intoleransınız) olduđu söylenmiře bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilalar (aminoglikozit antibiyotikler, kolitsin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol aar.

Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin CEPHİX'in biyoyararlılıđını % 70 oranına kadar artırabilir.

CEPHİX dođum kontrol haplarının etkinliđini azaltabilir. Bu nedenle hormonal olmayan ek bir dođum kontrol yöntemi uygulanması tavsiye edilir.

CEPHİX ve kumarin antikoagülanların (pıhtılařmayı önleyici) birlikte kullanımında seyrek olarak kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiřtir. Bu gibi vakalarda pıhtılařma parametreleri izlenmelidir.

Diğer sefalosporinlerle birlikte protrombin seviyesini arttırıldığı görülmüştür. Bu yüzden antikoagülasyon tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Coombs testini, diğer sefalosporinlerde olduğu gibi yalancı pozitifleştirebilir. Benedict ve Fehling testleri, bakır sülfat tabletleriyle idrar glukoz testlerinin sonuçlarını bozabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CEPHİX nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

CEPHİX'i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde yemeklerden önce ya da sonra kullanınız.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

CEPHİX, sadece ağızdan kullanım içindir.

- **Değişik yaş grupları:**

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda:

Tavsiye edilen doz günlük 200-400 mg arasında hastalığın şiddetine bağlı olarak tek doz veya 2 doza bölünerek verilebilir.

Çocuklarda Kullanımı:

Önerilen doz aşılmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yetişkinler için önerilen doz, yaşlı hastalar içinde geçerlidir. Yaşlılarda böbrek fonksiyonları değerlendirilmeli ve doz ayarlaması şiddetli böbrek yetmezliği esas alınarak yapılmalıdır.

- **Özel Kullanım Durumları:**

Böbrek Yetmezliği:

Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği dozu uygulayınız.

Eğer CEPHİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEPHİX kullandıysanız:

CEPHİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Aşırı doz aşımında mide yikanabilir.

Bu nedenle doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

CEPHİX'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEPHİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

CEPHİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, CEPHİX'in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Çünkü CEPHİX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CEPHİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEPHİX'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Trombosit sayısının azlığı (trombositopeni), kanda trombositlerin yüksek olması (trombositoz), kandaki lökosit miktarının azalması (lökopeni), akyuvar sayısının anormal derecede az olması (nötropeni), vücutta ani ve sık gelişebilen akyuvar sayısının azalması (agranülositoz) ve kanda eozinofili artması (eozinofili). Ayrıca karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde geçici yükselmeler.
- Kanlı-mukuslu ishal (Psödomembranöz kolit)
- Mukozalarda, deri altındaki dokularda ya da bir iç organda alerjik şişme (Anjiyoödem).
- Karaciğerde geçici transaminaz, alkalen fosfataz yükselmesi ve sarılık
- Böbrek iltihaplanması (nefrit),

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEPHİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Deri döküntüleri, kaşıntı (pruritus) ve kurdeşen (ürtiker)
- Eklem romatizması (artralji),
- Eritema multiforme ve Stevens-Johnson sendromu,
- İshal (diyare)
- Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu (toksik epidermal nekroliz).
- Genital kaşıntı ve vajina iltihabı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Baş dönmesi ve baş ağrısı
- Tedavi sırasında ve sonrasında gastrointestinal rahatsızlıklar,
- Bulantı ve kusma
- Mide gazı, karın ağrısı (dispepsi)

Bunlar CEPHİX'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CEPHİX'in Saklanması

CEPHİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CEPHİX'i kullanmayınız.

(Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.)

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz CEPHİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center, İhlamur Yıldız Cad., No: 10,
34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Üretici:

Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı
Kandaklar Mevkii - Adapazarı / SAKARYA
Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır