

KULLANMA TALİMATI

VERTİN® 8 mg Tablet

Ağızdan alınır

Etkin madde : Her bir tablette, 8 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal silika ve talk içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. **VERTİN® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VERTİN® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VERTİN® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VERTİN®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VERTİN® nedir ve ne için kullanılır?

VERTİN® oral yolla kullanılan yuvarlak, beyaz renkte, eğik kenarlı, bir yüzünde VERTİN yazılı tablettir. 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

VERTİN® etkin madde olarak 8 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.

- Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri
- İşitme kaybı veya işitme zorluğu
- Kulak çınlaması

Kulaktaki bir rahatsızlığa baęlı olarak ortaya çıkan bař dnmesi belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. VERTİN®'i kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

VERTİN® sadece yetiřkinlerde kullanılmaktadır.

VERTİN®'i ařaęıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Betahistin dihidroklorre veya VERTİN®'in herhangi bir bileřenine karřı ařırı duyarlılıęımız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

VERTİN®'i ařaęıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Feokromositoma (adrenal bezlerin tmoral oluřumu),
- Bronřiyal astım veya,
- Midede lseri hikayeniz varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız ve doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

VERTİN®'in yiyecek ve ieceklerle birlikte kullanılması

VERTİN®'i, yemeklerden nce, sonra veya yemeklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuz tarafından sylenmedike hamilelik sırasında VERTİN®'i kullanmayınız. nk ilacın hamilelik esnasında oluřabilecek olası zararlı etkilerinin deęerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

VERTİN®'in etkin maddesinin insan stne geip gemedięi bilinmemektedir.

Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin iin nemini, emzirmenizin yararları ve bebeęinize olası risklerine karřı deęerlendirmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araştırmalar VERTİN®'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.

VERTİN®'in içeriğinde bulunan bazı yabancı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her tablette 25 mg mannitol bulunur. Hiçbir olumsuz etki göstermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VERTİN®'in diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VERTİN® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

- VERTİN®'in yetişkinler için önerilen dozu, günde 3 defa olmak üzere 1-2 tablettir. Günde 6 tablettten (48 mg betahistin dihidroklorür) fazla kullanılmamalıdır.
- Tabletler ağız yoluyla yeterli miktarda suyla alınmalıdır.
- Hastalığınızdaki iyileşme sadece bir kaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin bir kaç ayından sonra elde edilebilir.
- Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz VERTİN®'in dozunu size göre ayarlayacaktır.
- Tedavinize erken dönemde başlanması durumunda, hastalığın ilerlemesinin ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybının önlenmesine dair bulgular mevcuttur .

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

- VERTİN® ağızdan kullanım içindir.
- Tabletler öğün arasında veya yemekten kısa bir süre sonra, yeterli miktarda suyla alınmalıdır.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanımı:

Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, VERTİN®'in, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

• Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerde VERTİN® dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda **VERTİN®** dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer VERTİN®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VERTİN® kullandıysanız:

VERTİN®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bir kaç doz aşımı (728 mg'a kadar) vakasında hafiften orta dereceye değişen şiddette belirtiler rapor edilmiştir. 728 mg dozda havale rapor edilmiştir. Bununla birlikte tüm vakalarda iyileşme tam olmuştur.

Aşırı doz tedavisi, doktorunuzun belirleyeceği standart destek tedavi yöntemlerini içermektedir.

VERTİN®'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VERTİN® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda, VERTİN® ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VERTİN®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir olarak, deri aşırı duyarlılık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.

Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.

Bunlar VERTİN®'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. VERTİN®'in Saklanması

VERTİN®'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Orjinal ambalajı içerisinde ve kuru bir yerde, 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra VERTİN®'i kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluk farkederseniz VERTİN®'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Orion Sağlık Grup Ticaret Ltd. Şti.
Kozyatađı Mah. Kaya Sultan Sok. Sarnem Plaza No:99/A
Kadıköy / İstanbul

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A. Ş.
39780 Küçükkarıştıran-Lüleburgaz/ KIRKLARELİ

Bu kullanma talimatı 27.01.2010 tarihinde onaylanmıştır.